

**1ª Lista de MAT216 - Cálculo III - IAGUSP**  
**Primeiro semestre de 2019**  
*Professor Oswaldo Rio Branco de Oliveira*

- 1-8. Resolver os oito exercícios ímpares 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15, da seção 12.2, *Derivação de Funções Definidas Implicitamente. Teorema Das Funções Implícitas* no Capítulo 12 de *Um Curso de Cálculo, Vol 2, 5ª ed.*, de H. L. Guidorizzi, pp. 226-244.

Resolva os exercícios abaixo.

9. **Raiz quadrada.** Sejam  $a$  e  $b$  dois números reais dados. Determine os pares  $(x, y)$  de números reais que resolvem o sistema

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ 2y = b. \end{cases}$$

[Note que é pedido para provar que o número complexo  $z = x + iy$  é solução da equação polinomial de ordem dois  $z^2 = a + ib$ , com  $i$  a unidade imaginária.]

10. Seja  $f$  uma função a valores reais e contínua definida no intervalo aberto  $(a, b)$ .
- (a)  $f$  é inversível se e só se  $f$  é estritamente crescente ou estritamente decrescente.  
(b) Se  $f$  é inversível, então a imagem de  $f$  é um intervalo aberto  $(c, d)$ .
11. Seja  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  uma função derivável.
- Se  $f$  é estritamente crescente então temos  $f'(x) \geq 0$ , para todo  $x$  em  $\mathbb{R}$ . A recíproca é verdadeira? Prove ou dê um contra-exemplo.

12. **Teorema do Valor Intermediário para Derivadas (Propriedade de Darboux):** Dada  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  derivável, então a imagem de  $f'$  é um intervalo.

13. **(Regra da Cadeia na reta real).** Sejam  $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  derivável em  $x_0$  e  $z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  derivável em  $y_0 = y(x_0)$ . Então, a composta  $z \circ y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  é derivável em  $x_0$  e

$$(z \circ y)'(x_0) = z'(y_0)y'(x_0).$$

**Definição.** Seja  $L(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$  o espaço (vetorial) das funções lineares de  $\mathbb{R}^n$  em  $\mathbb{R}^m$ .

14. Seja  $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  uma aplicação linear. Mostre que existe um vetor  $v \in \mathbb{R}^n$  tal que

$$T(x) = \langle x, v \rangle, \text{ para todo } x \in \mathbb{R}^n.$$

15. **(Diferenciabilidade).** Dada  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  e um ponto  $p$  em  $\mathbb{R}^n$ , são equivalentes:

- (1) Existem  $T$  em  $L(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$  e uma função vetorial  $e : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  tais que

$$F(p + h) = F(p) + T(h) + e(h), \text{ para todo } h \in \mathbb{R}^n, \text{ com } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e(h)}{|h|} = 0.$$

- (2) Existe uma aplicação linear  $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  tal que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(p + h) - F(p) - T(h)}{|h|} = 0.$$

- (3) Existem  $T$  em  $L(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$  e uma função vetorial  $R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  tais que

$$F(p + h) = F(p) + T(h) + R(h)|h|, \text{ com } R(0) = 0 \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0} R(h) = 0.$$

16. Dada  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , prove que  $F$  é diferenciável em um ponto  $p$  se e somente se

- Existem um vetor  $v$  em  $\mathbb{R}^n$  e uma função vetorial  $E : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  tais que

$$F(p + h) = F(p) + \langle v, h \rangle + \langle E(h), h \rangle, \text{ com } E(0) = 0 \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0} E(h) = 0.$$

17. Seja  $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$  contínua e positiva, com  $f(x) \rightarrow +\infty$  se  $|x| \rightarrow +\infty$ . Então,  $f$  assume um valor mínimo absoluto.