

**Convenções:**

- Dado um inteiro positivo  $n$ , o conjunto de todas as matrizes  $n \times n$  com entradas reais será denotado por  $M_n(\mathbb{R})$ .
- Se  $A$  é uma matriz, a matriz transposta de  $A$  será denotada por  $A^t$ .
- Coordenadas de pontos estão dadas em relação a um sistema ortogonal.
- A norma (ou comprimento) de um vetor  $\vec{u}$  será denotada por  $\|\vec{u}\|$ .
- Se  $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  e  $S: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$  são funções, define-se a função composta de  $S$  com  $T$  como sendo a função  $S \circ T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$  dada por  $(S \circ T)(v) = S(T(v))$ , para todo  $v \in \mathbb{R}^n$ .

**Q1.** Considere a reta  $r: \begin{cases} x = m + 2 + \lambda \\ y = 1 + \lambda \\ z = 1 + n\lambda \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$ , em que  $m, n \in \mathbb{R}$ . Se a

distância entre  $r$  e o plano de equação  $x + 2y + 3z - 6 = 0$  é  $\frac{\sqrt{14}}{7}$ , então  $m + n$  é igual a

- (a) 0 ou  $-4$
- (b) 2 ou  $-4$
- (c) 0 ou 2
- (d) 0 ou  $-2$
- (e) 2 ou  $-2$

**Q2.** Se  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$  são vetores tais que  $\|\vec{u}\| = 1$ ,  $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{3}$ , e o ângulo entre  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$  mede  $\pi/3$  radianos, então o valor de  $\|\vec{v}\|$  é

- (a) 1
- (b)  $\sqrt{3}$
- (c)  $\sqrt{2}/2$
- (d)  $1/2$
- (e)  $\sqrt{3}/2$

**Q3.** Considere o plano  $\pi$  de equação  $x + y + z = 0$  e seja  $r$  a reta perpendicular a  $\pi$  tal que  $B = (3, -1, 4)$  seja o ponto simétrico do ponto  $A = (2, 1, 3)$  com relação a  $r$ . Se  $P = (a, b, c)$  é o ponto de encontro entre  $r$  e  $\pi$ , então  $-2a + b + 2c$  é igual a

- (a)  $-2$
- (b)  $0$
- (c)  $2$
- (d)  $1$
- (e)  $-1$

**Q4.** Assinale a afirmação **FALSA** a respeito de uma matriz  $A \in M_n(\mathbb{R})$ .

- (a)  $A$  e sua transposta  $A^t$  possuem os mesmos autovalores.
- (b) Se  $A$  é diagonalizável, então  $A$  possui  $n$  autovalores distintos.
- (c) Se  $A$  é diagonalizável, então sua transposta  $A^t$  também é diagonalizável.
- (d) Se  $A$  é diagonalizável e invertível, então sua inversa  $A^{-1}$  também é diagonalizável.
- (e) Se  $A$  possui  $n$  autovalores (reais) distintos, então  $A$  é diagonalizável.

**Q5.** Sejam  $a, b \in \mathbb{R}$  e seja  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  a transformação matricial induzida pela matriz  $\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$ . Assinale a afirmação **FALSA**.

- (a) Se  $a^2 + b^2 = 1$ , então  $T$  é uma isometria.
- (b) A imagem, por  $T$ , do quadrado unitário tem área 1, quaisquer que sejam  $a, b \in \mathbb{R}$ .
- (c) Se a imagem, por  $T$ , do quadrado unitário tem área 1, então  $T$  é uma isometria.
- (d) Se  $T$  é uma isometria, então  $a^2 + b^2 = 1$ .
- (e) Se  $T$  é uma isometria, a imagem, por  $T$ , do quadrado unitário tem área 1.

**Q6.** Considere as seguintes afirmações a respeito de vetores  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ :

- (I) Se  $\vec{u} \wedge \vec{v} \neq \vec{0}$  e  $\vec{w} \wedge \vec{u} = \vec{0} = \vec{w} \wedge \vec{v}$ , então  $\vec{w} = \vec{0}$ .
- (II) Se  $\vec{u} \neq \vec{0}$ ,  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$  e  $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ , então  $\vec{v} = \vec{0}$ .
- (III)  $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{w}$  é uma combinação linear de  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ .

É correto o que se afirma em

- (a) (I), (II) e (III).
- (b) (I) e (II), apenas.
- (c) (II) e (III), apenas.
- (d) (I) e (III), apenas.
- (e) (II), apenas.

**Q7.** Se  $P = (a, b, c)$  é o ponto de encontro entre as retas

$$r : \begin{cases} x + y = 3 \\ y + z = 5 \end{cases} \quad \text{e} \quad s : -x + 3 = y = z - 1,$$

então  $a + b + c$  é igual a:

- (a) 8
- (b) 6
- (c) 5
- (d) 7
- (e) 4

**Q8.** Se  $T$  é a rotação, em  $\mathbb{R}^2$ , em torno da origem, de ângulo  $\frac{\pi}{3}$  radianos no sentido anti-horário e  $S: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  é a transformação tal que  $S \circ T$  é a reflexão em relação à reta  $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ , então  $S$  é a reflexão em relação à reta

- (a)  $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$
- (b)  $y = \sqrt{3}x$
- (c)  $x = 0$
- (d)  $y = x$
- (e)  $y = \frac{1}{2}x$

**Q9.** Considere o plano  $\pi : x - 2y + 2z - 5 = 0$ . Sejam  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$  vetores tais que  $\vec{u}$  é paralelo a  $\pi$ ,  $\vec{v}$  é ortogonal a  $\pi$  e  $\vec{u} + \vec{v} = (2, 3, -1)$ , então a soma das coordenadas de  $\vec{u}$  é igual a

- (a)  $-2/3$
- (b) 4
- (c)  $14/3$
- (d) 2
- (e)  $10/3$

**Q10.** A respeito da matriz  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ , é correto afirmar que

- (a) os únicos autovalores de  $A$  são 1 e 2.
- (b)  $A$  possui um único autovalor.
- (c)  $A$  tem exatamente dois autovalores distintos e é diagonalizável.
- (d)  $A$  tem três autovalores distintos.
- (e)  $A$  tem exatamente dois autovalores distintos e não é diagonalizável.

**Q11.** A respeito da matriz  $A = \begin{bmatrix} a & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ , em que  $a \in \mathbb{R}$ , é correto afirmar que

- (a) se  $A$  é diagonalizável, então  $a > 4$ .
- (b) se  $a = 3$ , então  $A$  é diagonalizável.
- (c) se  $a = 0$ , então  $A$  é diagonalizável.
- (d) se  $a > 4$ , então  $A$  é diagonalizável.
- (e) se  $A$  é diagonalizável, então  $a \leq 0$ .

**Q12.** Seja  $A$  uma matriz  $n \times n$  e suponha que a única solução do sistema  $AX = 0$  seja a solução nula. Assinale a alternativa **FALSA**.

- (a) A matriz transposta  $A^t$  de  $A$  tem determinante não nulo.
- (b) Se  $R$  é uma matriz escalonada obtida a partir de  $A$  por operações elementares sobre linhas, então  $R$  não tem linhas nulas.
- (c) Se  $B$  é uma matriz  $n \times n$  tal que  $BA = 0$ , então  $B = 0$ .
- (d)  $0$  é um autovalor de  $A$ .
- (e) Para todo  $b \in \mathbb{R}^n$ , o sistema  $AX = b$  tem uma única solução.

**Q13.** Assinale a afirmação **FALSA** a respeito da matriz  $A = \begin{bmatrix} 0 & a & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix}$ , em que  $a \in \mathbb{R}$ .

- (a) Se  $a = 1/2$ , então  $A$  é diagonalizável.
- (b) Se  $A$  é diagonalizável, então  $a > 0$ .
- (c) Se  $a = 0$ , então  $0$  é um autovalor de  $A$ , de multiplicidade 3.
- (d) Se  $0 \leq a < 1/2$ , então  $A$  é diagonalizável.
- (e) Os autovalores de  $A$  são as raízes reais do polinômio  $(x^2 - a)(x - a)$ .

**Q14.** Dado que

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -6 & 2 & 0 \\ 8 & 8 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -6 & 2 & 0 \\ 8 & 8 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

a solução geral do sistema de equações diferenciais

$$X'(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} X(t)$$

é

(a)  $X(t) = c_1 e^{-2t} \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} + c_3 e^t \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R})$

(b)  $X(t) = c_1 e^{-t} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 e^t \begin{bmatrix} 8 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R})$

(c)  $X(t) = c_1 e^{-t} \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 8 \end{bmatrix} + c_2 e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 8 \end{bmatrix} + c_3 e^t \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R})$

(d)  $X(t) = c_1 e^{-2t} \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 8 \end{bmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 8 \end{bmatrix} + c_3 e^t \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R})$

(e)  $X(t) = c_1 e^{-t} \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} + c_3 e^t \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R})$

**Q15.** Considere o plano  $\pi$  de equação  $ax + by + cz - 12 = 0$ , em que  $a, b, c \in \mathbb{R}$ . Sabendo que  $B = (-1, 6, 5)$  é o ponto simétrico do ponto  $A = (1, 2, 3)$  em relação a  $\pi$ , pode-se afirmar que  $a + b + c$  é igual a

- (a) 0
- (b) -2
- (c) 4
- (d) 2
- (e) -4

**Q16.** Sejam  $a, b \in \mathbb{R}$ . A respeito do sistema

$$(*) \begin{cases} x - 2y + z = 3 \\ 2x + y - 2z = 2b \\ -5y + 2az = 7 \\ 4x - 3y = 5 \end{cases}$$

é correto afirmar que

- (a) se  $b \neq -1/2$  e  $a = 2$ , então (\*) tem infinitas soluções.
- (b) se  $a = 2$  e  $b \in [0, 1]$ , então (\*) uma única solução.
- (c) se  $a = b = 1/2$ , então (\*) tem uma única solução.
- (d) se  $a \neq 2$  e  $b \in [0, 1]$ , então (\*) tem solução.
- (e) se  $b = -1/2$  e  $a \neq 2$ , então (\*) tem infinitas soluções.