

# Sistemas Complexos

Luiz Renato Fontes

# Grafo aleatório de Erdős e Rényi

Seja  $K_n = (V_n, E_n)$  o grafo com  $n$  sítios (vértices):



$V_n = \{1, \dots, n\}$ ; e elos entre cada par de sítios:

$E_n = \{\langle i, j \rangle : i, j \in V_n, i \neq j\}$

O grafo aleatório de Erdős e Rényi consiste, fixado  $p \in [0, 1]$ , no grafo

$$G_n(p) := (V_n, E_n(p)),$$

onde  $E_n(p)$  é uma amostra de elos de  $E_n$  escolhida por meio da seguinte família de va's iid  $\{\eta_e; e \in E_n\}$  com distr de Bernoulli de parâmetro  $p$ :  $E_n(p) = \{e \in E_n : \eta_e = 1\}^*$ .



\* $\mathbb{P}(\eta_e = 1) = p = 1 - \mathbb{P}(\eta_e = 0)$ ; se  $\eta_e = 1$ , diz-se que  $e$  está *aberto* ou *presente*; do contrário, *fechado* ou *ausente*

## Regime crítico; Transição de fase

Regime:  $p = \lambda/n$ ,  $\lambda > 0$  e  $n > \lambda$ .

Interesse na ocorrência ou não de *componente gigante* (com  $\sim n$  sítios) *com alta probabilidade* (c.a.p.), dependendo do valor de  $\lambda$ .

c.a.p.: com probabilidade  $\rightarrow 1$  qdo  $n \rightarrow \infty$

**Teorema 1.** Seja  $\lambda = np$ , com  $\lambda > 0$  fixo.

(i) Se  $\lambda < 1$ , então c.a.p. o maior componente de  $G(n, p)$  tem no máximo  $\frac{3}{(1-\lambda)^2} \log n$  sítios.

(ii) Se  $\lambda > 1$  e  $\beta = \beta(\lambda) > 0$  for a prob de sobrevivência de um processo de ramificação com distribuição de prole de Poisson( $\lambda$ ), então c.a.p. o *maior componente* de  $G(n, p)$  tem

$$(1 + o(1)) \beta n \text{ sítios;}$$

além disto, o *segundo maior componente* tem no máximo

$$\frac{16\lambda}{(\lambda-1)^2} \log n \text{ sítios.}$$

## Teo 1 (Obs)

A noção de conectividade é a natural (e usual): dois sítios  $x$  e  $y$  de  $V_n$  estão conectados se  $x = y$  ou se houver um caminho de elos abertos ligando  $x$  a  $y$ ; em outras palavras, se existirem  $\ell \geq 1$  e

$$x = x_0, \dots, x_\ell = y \in V_n \text{ tq } \eta_{\langle x_{i-1}, x_i \rangle} = 1, i = 1, \dots, \ell.$$

Sejam  $\mathcal{C}_1^*, \mathcal{C}_2^*$  o primeiro e segundo maiores componentes, respectivamente (segundo o número de sítios; com algum critério de desempate, se necessário).

Então, fixado  $\varepsilon > 0$  arbitrário, as afirmações do Teo 1 dizem que as seguintes probabilidades se anulam no limite qdo  $n \rightarrow \infty$ :

$$(i) \mathbb{P}\left(|\mathcal{C}_1^*| > \frac{3}{(1-\lambda)^2} \log n\right);$$

$$(ii) \mathbb{P}\left(|\mathcal{C}_1^*| < (1 - \varepsilon)\beta n\right), \mathbb{P}\left(|\mathcal{C}_1^*| > (1 + \varepsilon)\beta n\right),$$

$$\mathbb{P}\left(|\mathcal{C}_2^*| > \frac{16\lambda}{(\lambda-1)^2} \log n\right)$$

## Lembrete: Processo de Ramificação

Modela os tamanhos de sucessivas gerações de uma família:

$Z_0 =$  tamanho inicial; para  $k \geq 1$ ,

$$Z_k = \begin{cases} \sum_{j=1}^{Z_{k-1}} X_{kj}, & \text{se } Z_{k-1} > 0; \\ 0, & \text{se } Z_{k-1} = 0, \end{cases} \text{ onde}$$

$\{X_{ij}; i, j \geq 1\}$  é uma família de v.a.'s iid inteiras não negativas;

$Z_k$  representa o tamanho da  $k$ -ésima geração,  $k \geq 1$ ;


$X_{ij}$  representa(ria) o número de filhos do  $j$ -ésimo indivíduo da  $i - 1$ -ésima geração (se ele estiver presente naquela geração);

Note que se  $Z_\ell = 0$  para algum  $\ell \geq 0$ , então,  $Z_i = 0$ ,  $i > \ell$ ,

e, neste caso, dizemos que a família se extingue;

Seja  $\beta = \mathbb{P}(\text{sobrevivência})$ ; no caso de  $X_{11} \sim \text{Poisson}(\lambda)$ ,  $\lambda > 0$ , denotamos  $\beta = \beta(\lambda)$ . Sabe-se que  $\beta > 0$  sse  $\mathbb{E}(X_{11}) > 1$ .

# Simulação do proc ramificação



## Processo de crescimento para um aglomerado de $G_n(p)$

Seja  $x \in V_n$ , e  $C_x$  o *aglomerado de  $x$* , ie,

$$C_x = \{y \in V_n : y \text{ está conectado a } x\}.$$

Vamos construir  $C_x$  por um processo de crescimento a ser subsequentemente comparado com processos de ramificação:

Começamos com  $Z_0 = W_0 = \{x\}$ ;

para  $k \geq 1$ , enqto  $\emptyset \neq Z_{k-1} = \{y_1^{k-1}, \dots, y_{r_{k-1}}^{k-1}\}$ , façamos


$$Y_j^k = \emptyset, \text{ e para } j = 1, \dots, r_{k-1}:$$

$$X_{kj} = \{y \in V_n \setminus W_{k-1} \setminus Y_{j-1}^k : \langle y_j^{k-1}, y \rangle \text{ aberto}\};$$

$$Y_j^k = Y_{j-1}^k \cup X_{kj}; \quad Z_k = Y_{r_{k-1}}^k; \quad W_k = W_{k-1} \cup Z_k.$$

Seja  $K = K_x = \min\{k \geq 1 : Z_k = \emptyset\}$ . Então,  $C_x = W_K$ .

# Simulação do proc crescimento





## Processo de adição e saturação

Vamos pensar no processo de crescimento como feito passo a passo, com os passos sucessivos

$$0, R_0 = 1, R_0 + 1, \dots, R_1, R_1 + 1, \dots, R_{\mathcal{K}},$$

onde  $R_k = r_0 + \dots + r_k$ ,  $k = 0, \dots, \mathcal{K}$ .

No passo 0/inicial, começamos com o aglomerado inicial  $\{x\}$ ; em dado passo seguinte  $R_0, R_0 + 1, \dots$ :

- (i) *adicionamos* novos sítios, a saber, os elementos de  $\mathcal{X}_{kj}$ , para certos  $1 \leq k \leq \mathcal{K}$ ,  $1 \leq j \leq r_{k-1}^\dagger$ , ao aglomerado do passo anterior:  $\mathcal{W}_{k-1} \cup \mathcal{Y}_{j-1}^k$  — o que resulta no aglomerado do passo atual:  $\mathcal{W}_{k-1} \cup \mathcal{Y}_j^k$  —, e
- (ii) declaramos  $y_j^{k-1}$  *saturado*.

---

<sup>†</sup>segundo a ordem natural do proc cres, como descrito no slide 7

## Obs.

- 1) Pode (e vai) acontecer de em dado passo, o correspondente  $\mathcal{X}_{kj}$  ser vazio; neste caso, na prática não há adição, mas de toda forma há saturação de  $y_j^{k-1}$ ;
- 2) A cada passo do proc cresc após o passo inicial, o correspondente  $y_j^{k-1}$  pertence ao *aglomerado do passo anterior*  $\mathcal{W}_{k-1} \cup \mathcal{Y}_{j-1}^k$ ;
- 3) No final do procedimento (completado o passo  $R_{\mathcal{K}}$ ),  $\mathcal{C}_x$  consiste exatamente de todos os sítios saturados pelo procedimento.

No  $i$ -ésimo passo do procedimento,  $i \geq 1$ , seja  $\mathcal{A}_i$  o aglomerado do passo anterior, ie, para os correspondentes  $k, j$  na rotulagem original,  $\mathcal{A}_i = \mathcal{W}_{k-1} \cup \mathcal{Y}_{j-1}^k$ ; e sejam

$$A_i = |\mathcal{A}_i| \text{ e } X_i = |\mathcal{X}_{kj}|.$$

- 4) a) Para  $i \geq 1$ ,  $A_i = \sum_{\ell=0}^{i-1} X_\ell$ , onde  $X_0 = 1$ ;  
b) dado que  $A_i = m$ , com  $1 \leq m \leq n$ ,  $X_i \sim \text{Bin}(n - m, p)$ ;  
note que, se  $m = o(n)$ , então  $X_i \approx \text{Poisson}(\lambda)$ ;
- 5) Podemos obter, aumentando o esp de prob subjacente, se necessário, para dada realização de  $X_1, X_2, \dots$ , uma seq de v.a.'s  $X_1^+, X_2^+, \dots$  iid com  $X_1^+ \sim \text{Bin}(n, p)$  e  $X_i \leq X_i^+$ ,  $i \geq 1$ .

## $G_n(p)$ e Ramificação

Vamos usar o proc ramif com desc Poisson( $\lambda$ ) para analisar  $G_n(p)$  a partir dos aglomerados de sítios de  $G_n(p)$ , cujos primeiros estágios de crescimento, como indicado acima, tem adições  $X_i$  com distr aprox  $\text{Bin}(n, p) \approx \text{Poisson}(\lambda)$  enqto  $A_i$  não for muito grande (da ordem de  $n$ ).

Quando  $\lambda < 1$ , os aglomerados do proc de ram nunca são muito grandes, então esta estratégia funciona bem neste caso.

Quando  $\lambda > 1$ , há sobrevivência no proc de ram (família com infinitas gerações não vazias) com prob  $> 0$ , e se dada geração da família for bastante grande, então haverá alta prob de sobrevivência da família.

Ideia da dem do Teo 1 (ii): como há muitos sítios em  $V_n$ , e enqto os respectivos aglomerados não forem muito grandes, tudo se passa como na ramif: a prob de pelo menos um aglomerado atingir tamanho bastante grande é próx de 1; além disto, dado o confinamento de  $G_n(p)$ <sup>‡</sup>, se dois aglomerados atingem um tamanho bastante grande, então subsequentemente coalescem com alta prob.

---

<sup>‡</sup>algo que não ocorre na ramif

## Teo 1 — Dem de (i)

Basta mostrar que a prob com  $\mathcal{C}_1$  no lugar de  $\mathcal{C}_1^*$  é  $o(1/n)$ , pois, fazendo  $\ell = \lceil \frac{3}{(1-\lambda)^2} \log n \rceil$ , temos que

$$\mathbb{P}(|\mathcal{C}_1^*| > \ell) = \mathbb{P}(\cup_{x \in V_n} \{|\mathcal{C}_x| > \ell\}) \leq n \mathbb{P}(|\mathcal{C}_1| > \ell).$$

Segundo o procedimento de construção descrito anteriormente, temos  $R_{\mathcal{X}} > \ell$ , e logo ao menos  $\ell + 1$  sítios adicionados nos passos de 1 a  $\ell + 1$  (pois os sítios saturados em dado passo foram incluídos até aquele passo — de fato, antes). Logo

$$\mathbb{P}(|\mathcal{C}_1| > \ell) \leq \mathbb{P}(\sum_{i=0}^{\ell+1} X_i > \ell) = \mathbb{P}(\sum_{i=1}^{\ell+1} X_i \geq \ell) \leq \mathbb{P}(\sum_{i=1}^{\ell+1} X_i^+ \geq \ell) (*)$$

Note que  $\sum_{i=1}^{\ell+1} X_i^+ \sim \text{Bin}((\ell + 1)n, p)$ .

Poderíamos agora prosseguir usando cotas de Chernoff para a cauda da distr binom (note que  $(\ell + 1)np \sim \lambda \ell \ll \ell$ , pois  $\lambda < 1$ ).

Em vez disto, vamos comparar a distr binom com a distr Poisson, e obter cotas + diretas para a esta.

## Comparação da distr binom com a distr de Poisson

**Fatos:** (i) Dado  $p \in (0, \frac{1}{2})$ , seja  $\tilde{p} = -\log(1-p)$ , e  $Y_1, Y_2, \dots$  va's iid  $\sim \text{Poisson}(\tilde{p})$ . Então, para  $N \geq 1$ ,

$B := \sum_{i=1}^N \mathbb{1}_{\{Y_i > 0\}} \sim \text{Bin}(N, p)$  (verifique) e, claramente,

$$B \leq S := \sum_{i=1}^N Y_i \sim \text{Poisson}(N\tilde{p}). \quad (1)$$

(ii) Por outro lado  $\{S > B + 5\}$  está contido em

$$\begin{aligned} & \left\{ \sum_{i=1}^N \mathbb{1}_{\{Y_i \geq 4\}} \geq 1 \right\} \cup \left\{ \sum_{i=1}^N \mathbb{1}_{\{Y_i = 2\}} \geq 6 \right\} \\ & \cup \left\{ \sum_{i=1}^N \mathbb{1}_{\{Y_i = 3\}} = 1; \sum_{i=1}^N \mathbb{1}_{\{Y_i \geq 2\}} \geq 3 \right\} \end{aligned}$$

Subadtvd: probs dos eventos da união acima podem ser cotados por

$$N\mathbb{P}(Y_1 \geq 4), N^6\mathbb{P}(Y_1 = 2)^6 \text{ e } N^3\mathbb{P}(Y_1 = 3)\mathbb{P}(Y_1 \geq 2)^2, \text{ resp;}$$

por sua vez, estas expr podem ser cotadas por, a menos de cte mult,

$$Np^4, (Np^2)^6 \text{ e } N^3p^7, \text{ resp.}$$

$$\therefore \mathbb{P}(S > B + 5) \leq \text{const} \{Np^4 + (Np^2)^6 + N^3p^7\}. \quad (2)$$

**Corolário.** Do fato (1), temos a seguinte cota superior para a última prob em (\*) no slide anterior:  $\mathbb{P}(S^+ \geq \ell)$ , onde  $S^+ \sim \text{Poisson}((\ell + 1)n\tilde{p})$ .

## Estimação de $\mathbb{P}(S^+ \geq \ell)$ §

$$\mathbb{P}(S^+ \geq \ell) = e^{-M} \sum_{i=\ell}^{\infty} \frac{M^i}{i!} = e^{-M} \frac{M^M}{M!} \sum_{i=\ell}^{\infty} \overbrace{\prod_{j=M+1}^i \frac{M}{j}}^{s_1}, \text{ onde}$$

$M = (\ell + 1)n\tilde{p} \sim \lambda\ell$ , e por Stirling,  $e^{-M} \frac{M^M}{M!} \sim \frac{\text{const}}{\sqrt{M}} \leq 1$ . Agora,

$$s_1 \leq \sum_{k=0}^{\infty} \underbrace{\prod_{j=M+1}^{\ell} \frac{M}{j}}_{\text{ñ dep de } k} \underbrace{\prod_{j=\ell+1}^{\ell+k} \frac{M}{j}}_{\leq (M/\ell)^k} \leq \exp\left\{ -M \underbrace{\sum_{j=M+1}^{\ell} \log\left(\frac{j}{M}\right) \frac{1}{M}}_{s_2} \right\} \underbrace{\frac{1}{1 - M/\ell}}_{\sim 1/(1-\lambda)},$$

e temos que  $s_2 \approx \int_1^{\frac{1}{\lambda}} \log x \, dx = \frac{1-\lambda}{\lambda} \log \frac{1}{\lambda} \geq \frac{(1-\lambda)^2}{\lambda}$ .

Como  $M \sim \lambda \frac{3}{(1-\lambda)^2} \log n$ , segue que para  $n$  grande

$$s_1 \leq \frac{\text{const}}{1-\lambda} n^{-2} = o(1/n) \quad \square \text{Teo 1 (i)}$$

**Obs.** Note que obtemos igualmente a cota de  $o(1/n)$  se substituirmos 3 por qualquer  $\text{const} > 1$ , e logo o Teo 1 (i) é válido com esta substituição.

---

§ lembre que  $\lambda < 1$  neste caso

## Dem. Teo 1 (ii) — Lema 1

Sejam  $k_- = \frac{16\lambda}{(\lambda-1)^2} \log n$  e  $k_+ = n^{2/3}$ . Lembre que  $\lambda > 1$  neste caso.

**Lema 1** C.a.p., para todo  $k \in [k_-, k_+]$  e todo sítio  $x \in V_n$ , ou o proc cresc de  $\mathcal{C}_x$  descrito acima termina antes de  $k_-$  passos ou há pelo menos  $(\lambda - 1)k/2$  sítios *não saturados* gerados pelo proc cresc até aí. Em particular, c.a.p., nenhum aglomerado de  $G_n(p)$  tem (exatamente)  $k$  sítios com  $k \in [k_-, k_+]$ .

**Dem.** Dado  $x \in V_n$ , se  $R_{\mathcal{K}} \geq k$ , então no (final do) passo  $k$  do proc de cresc de  $\mathcal{C}_x$  temos  $k + 1$  sítios sat, e  $N_k := \sum_{\ell=1}^k X_\ell - k$  sítios não sat.

No evento  $E_k^x = \{R_{\mathcal{K}} \geq k, N_k \leq (\lambda - 1)k/2\}$ , temos que

$$\sum_{\ell=1}^k X_\ell \leq k + (\lambda - 1)k/2 = (\lambda + 1)k/2,$$

e logo, supondo ainda  $k \leq k_+$ , temos que  $A_\ell \leq \frac{\lambda+1}{2}k_+$ ,  $1 \leq \ell \leq k$ .

Da 1ª parte da Obs. 4b no Slide 10, segue que existem, no espaço de prob aumentado do modelo como na Obs. 5 no mesmo slide, va's

$X_1^-, \dots, X_k^-$  iid  $\sim \text{Bin}(n - \frac{\lambda+1}{2}k_+, p)$  tq, em  $E_k^x$ ,  $X_\ell^- \leq X_\ell$ ,  $\ell \leq k$ .

## Dem. Lema 1 (cont)

A prob de  $E_k^x$  é então limitada para  $k \in [k_-, k_+]$  por

$$\mathbb{P}(\sum_{\ell=1}^k X_{\ell}^- \leq \frac{\lambda+1}{2} k) \leq \mathbb{P}(S_- \leq K') + o(1/n^{5/3}), \quad (1)$$

onde  $K' = \frac{\lambda+1}{2} k + 5$ ,  $S_- \sim \text{Po}(K)$ ,  $K = k(n - \frac{\lambda+1}{2} k_+) \tilde{p}$ .

**Obs.** Usamos (2) do Slide 13 com  $N = k(n - \frac{\lambda+1}{2} k_+) \leq n^{5/3}$ .

### Estimação de $\mathbb{P}(S_- \leq K')$ ¶

**Obs.**  $K' \sim \lambda' k$ ,  $K \sim \lambda k$ ,  $\lambda' = \frac{\lambda+1}{2} < \lambda$ , logo  $K' \ll K$  para  $n$  gde.

Dados  $a, b$  tq  $\lambda' < a < b < \lambda$ , se  $n$  gde,  $\mathbb{P}(S_- \leq K')$  é cotada por

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{ak} e^{-bk} \frac{(bk)^i}{i!} &\leq \left(\frac{b}{a}\right)^{ak} e^{-bk} \sum_{i=1}^{ak} \frac{(ak)^i}{i!} \leq \left(\frac{b}{a}\right)^{ak} e^{-bk} e^{ak} \\ &= \left(\frac{b}{a} e^{1-\frac{b}{a}}\right)^{ak} \leq \left(\frac{b}{a} e^{1-\frac{b}{a}}\right)^{ak-} = n^{-2\mathcal{P}}, \end{aligned} \quad (2)$$

onde  $\mathcal{P} = \frac{8\lambda}{(\lambda-1)^2} a \left(\frac{b}{a} - 1 - \log\left(\frac{b}{a}\right)\right)$ .

¶ lembre que  $\lambda > 1$  neste caso



## Est. $\mathbb{P}(S_- \leq K')$ (cont.)

**Lema 1'.** Dado  $\lambda > 1$ , existem  $a, b$  como acima tq  $\mathcal{P} > 1$ .

**Dem.** Por continuidade, basta tomar  $a = \lambda'$ ,  $b = \lambda$ .

Neste caso, fazendo  $\delta = \frac{\lambda-1}{\lambda+1}$ , temos que

$$\mathcal{P} = (1 + \delta) \frac{2}{\delta^2} (\delta - \log(1 + \delta)).$$

Note que  $\delta = \delta(\lambda) : (1, \infty) \rightarrow (0, 1)$ .

Expandindo o log em Taylor em torno de 0 e rearranjando:

$$\mathcal{P} = 1 + \sum_{j \geq 1} \frac{(1-\delta)^{j+1}}{j(j+1)(2j+1)} \delta^{2j-1} > 1 \text{ se } \delta > 0. \quad \square$$

## Dem. Lem 1 (cont)

De volta à dem Lema 1, usando o Lema 1' em (2), subst em (1), temos que

$$\mathbb{P}(E_k^x) = o(1/n^{5/3}). \quad (3)$$

Agora, o evento  $E_n$  em que o proc de cresc de algum sítio de  $V_n$  chegou a algum passo  $k \in [k_-, k^+]$  com menos do que  $\frac{\lambda-1}{2}k$  sítios não saturados satisfaz

$$E_n \subset \cup_{x \in V_n} \cup_{k \in [k_-, k^+]} E_k^x.$$

Por subaditividade —  $|V_n| = n$ ,  $k^+ = n^{2/3}$  — e (3), temos que

$$\mathbb{P}(E_n) \leq n \times n^{2/3} \times o(1/n^{5/3}) = o(1) \quad \square \text{Lema 1}$$

## Lema 2

Se  $x, y \in V_n$  são tais que  $|\mathcal{C}_x|, |\mathcal{C}_y| \geq k_+$ , então c.a.p.  $\mathcal{C}_x = \mathcal{C}_y$ .

**Dem.** Dados  $x \neq y \in V_n$ , se  $R_{\mathcal{K}_x}, R_{\mathcal{K}_y} \geq k_+$ , sejam  $\mathcal{N}_z$  o conjunto de sítios não saturados no passo  $k_+$  do proc cresc de  $\mathcal{C}_z$ ,  $z = x, y$ . Note que  $|\mathcal{N}_z| = N_z$  (vide 1º par dem Lema 1, slide 15). Pelo Lema 1, no evento

$$\hat{E}_{xy} := \{R_{\mathcal{K}_x}, R_{\mathcal{K}_y} \geq k_+\}, \text{ temos que c.a.p. } N_z \geq \frac{\lambda-1}{2} k_+, z = x, y.$$

Em  $\{R_{\mathcal{K}_z} \geq k_+\}$ , seja  $\mathcal{S}_z$  o conjunto de sítios saturados no passo  $k_+$  do proc cresc de  $\mathcal{C}_z$ ,  $z = x, y$ . Temos então que, em  $\{R_{\mathcal{K}_x}, R_{\mathcal{K}_y} \geq k_+\}$ , ou  $\{\mathcal{N}_x \cup \mathcal{S}_x\} \cap \{\mathcal{N}_y \cup \mathcal{S}_y\} \neq \emptyset$ , e neste caso  $\mathcal{C}_x = \mathcal{C}_y$ ; se não,  $\mathcal{N}_x \cap \mathcal{N}_y = \emptyset$ .

Logo, em  $\hat{E}_{xy}$ , para que  $\mathcal{C}_x \neq \mathcal{C}_y$ , é preciso que ocorra o evento  $\tilde{E}_{xy}$  de que os elos  $(u, w)$ ,  $u \in \mathcal{N}_x$ ,  $w \in \mathcal{N}_y$  devem estar todos fechados. Como neste caso nenhum destes elos terá sido ainda examinado até o passo  $k_+$ , temos que, fazendo  $E_{xy}^* = \hat{E}_{xy} \cap \tilde{E}_{xy}$ ,

$$\mathbb{P}(E_{xy}^*) \leq (1-p)^{\binom{\lambda-1}{2} k_+} = \left[ \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \right]^{\frac{(\lambda-1)^2}{4} n^{1/3}} \leq e^{-\frac{\lambda(\lambda-1)^2}{4} n^{1/3}} = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$\therefore$  a prob de que  $\exists x, y \in V_n$  tq  $|\mathcal{C}_x|, |\mathcal{C}_y| \geq k_+$  e  $\mathcal{C}_x \neq \mathcal{C}_y$  é cotada por

$$\mathbb{P}(\cup_{x,y \in V_n} E_{xy}^*) \leq n^2 \times o\left(\frac{1}{n^2}\right) \rightarrow 0 \text{ qdo } n \rightarrow \infty.$$

□ Lema 2

## Dem. Teo 1 (ii) — Lema 3

Dos lemas anteriores, temos que c.a.p. cada sítio  $x$  de  $V_n$  pode ser classificado como

pequeno: se  $|\mathcal{C}_x| \leq k_-$ ; ou como

grande: se  $|\mathcal{C}_x| \geq k_+$ ; todos os sítios gdes num mesmo aglom

Para completar a prova do teo:

estimar  $Y := \#\{\text{sítios pequenos de } G_n(p)\}$

**Lema 3.** C.a.p.  $Y = [1 - \beta - o(1)]n$

**Dem.** Dado  $x \in V_n$ , seja  $\rho = \rho(n, p) = \text{prob de que } x \text{ seja peq.}$

Então  $\rho \leq \rho_+(n, p) = \text{prob ext proc ram c/desc Bin}(n - k_-, p)$ .

(Pois, como apontado na situação similar no final do slide 15,

podemos obter a existência de va's  $\tilde{X}_1, \tilde{X}_2, \dots$  iid com distr

$\text{Bin}(n - k_-, p)$  tq  $\tilde{X}_\ell \leq X_\ell$ ,  $\ell \leq R_K$ , em  $\{|\mathcal{C}_x| \leq k_-\}$ ; logo,

$|\mathcal{C}_x| \leq k_- \Rightarrow \text{tamanho da família do proc ram com desc } \tilde{X} \leq k_-$ .)

## Dem. Lem 3 (cont)

Por outro lado, como  $X_\ell \leq X_\ell^+$ , se ocorrer o evento

$$A = \{\text{proc ram } c/\text{desc } X^+ \text{ se extingue até passo } k_-\},$$

então  $|C_x| \leq k_-$ ; logo

$$\begin{aligned} \rho \geq \mathbb{P}(A) &= \overbrace{\mathbb{P}(\text{proc ram } c/\text{desc } X^+ \text{ se extingue})}^{:=\rho_-} \\ &\quad - \mathbb{P}(\text{proc ram } c/\text{desc } X^+ \text{ se extingue após } k_- \text{ passos}) \\ &= \rho_- + o(1) \end{aligned}$$

**Obs.**  $\rho_+, \rho_- \rightarrow 1 - \beta$  qdo  $n \rightarrow \infty$

Segue que  $\mathbb{E}(Y) = n\rho = n(1 - \beta + o(1))$ .

Note agora que  $Y^2 = (\sum_{x \in V_n} \mathbb{1}_{\{|C_x| \leq k_-\}})^2 =$

$$= \sum_{x \in V_n} \mathbb{1}_{\{|C_x| \leq k_-\}} \left[ \underbrace{\sum_{y \in C_x} \mathbb{1}_{\{|C_y| \leq k_-\}}}_{|C_x|} + \sum_{y \notin C_x} \mathbb{1}_{\{|C_y| \leq k_-\}} \right]$$

---

<sup>||</sup> mesmo proc cresc p/proc ram do que p/ $C_x$

## Dem. Lem 3 (cont)

$$\therefore \mathbb{E}(Y^2) \leq n\rho k_- + \sum_{x \in V_n} \mathbb{E}[\sum_{y \notin \mathcal{C}_x} \mathbb{1}_{\{|\mathcal{C}_y| \leq k_-\}}; |\mathcal{C}_x| \leq k_-] \quad (1)$$

**Obs.**  $\{\mathcal{C}_y, y \notin \mathcal{C}_x\}$ : componentes de  $G_{n-|\mathcal{C}_x|}(p)$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\cdots] &= \sum_{C \subset V_n: |C| \leq k_-} \sum_{y \notin C} \mathbb{P}(|\mathcal{C}_y| \leq k_-; \mathcal{C}_x = C) \\ &= \sum_{k=1}^{k_-} \sum_{C: |C|=k} \sum_{y \in V_{n-k}} \underbrace{\mathbb{P}(|\mathcal{C}_y^k| \leq k_-)}_{\rho(n-k, p)} \mathbb{P}(\mathcal{C}_x = C) \\ &\leq \max_{1 \leq k \leq k_-} \rho(n-k, p) n\rho \\ &= n\rho\rho(n-k_-, p) \leq n\rho\rho_+(n-k_-, p), \end{aligned} \quad (2)$$

onde  $\mathcal{C}_y^k$  é o aglomerado de  $y$  em  $G_{n-k}(p)$ .

Subst (2) em (1):

$$\mathbb{E}(Y^2) \leq n^2 \rho \rho_+(n-k_-, p) \leq (1 + o(1)) [\mathbb{E}(Y)]^2 \quad (3)$$

## Dem. Lem 3 (cont)

Tchebichev:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|Y - \mathbb{E}(Y)| > \varepsilon \mathbb{E}(Y)) &\leq \frac{\text{Var}(Y)}{\varepsilon^2 (\mathbb{E}(Y))^2} = \frac{\mathbb{E}(Y^2) - (\mathbb{E}(Y))^2}{\varepsilon^2 (\mathbb{E}(Y))^2} \\ &\stackrel{(3)}{\leq} \frac{o(1)}{\varepsilon^2} \rightarrow 0 \text{ qdo } n \rightarrow \infty \forall \varepsilon > 0,\end{aligned}$$

e, logo, podemos tomar  $\varepsilon = o(1)$ .

□ Lema 3, Teo 1 (ii)