

LISTA 1 DE EXERCÍCIOS

1. Mostre que dados $z, w \in \mathbb{C}$ então $(z + w)^n = \sum_{p=0}^{p=n} \binom{n}{p} z^p w^{n-p}$, para $n = 0, 1, 2, \dots$

2. Escreva na forma binômica ($z = x + iy$, com $x, y \in \mathbb{R}$) os números complexos:

$$(a) (4-i) + i - (6+3i)i \quad (b) \frac{3-i}{4+5i} \quad (c) \left(\frac{2+i}{3-2i} \right)^2.$$

3. Se $z = x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}$), determine as partes real e imaginária de:

$$(a) z^4 \quad (b) \frac{z-1}{z+1} \quad (c) \frac{1}{z^2}.$$

4. (Raízes Quadradas) Determine elementarmente (i.e., não utilize Fórmula de Moivre ou Fórmula de Euler) as soluções $z \in \mathbb{C}$ da equação

$$z^2 = a + ib, \quad \text{onde } a, b \in \mathbb{R}.$$

Dica: Determine as partes real e imaginária de z e uma fórmula para z .

5. Dados $z, w \in \mathbb{C}$ mostre que:

$$(a) |z \pm w|^2 = |z|^2 + |w|^2 \pm 2\operatorname{Re}(z\bar{w})$$

$$(b) |z + w|^2 + |z - w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2) \quad (\text{lei do paralelogramo; interprete tal lei})$$

6. Sejam z_1, \dots, z_n arbitrários em \mathbb{C} . Mostre que

$$|z_1 + \dots + z_n| \geq |z_1| - |z_2| - \dots - |z_n|.$$

7. Seja $p(z) = a_0 + a_1z + \dots + a_nz^n$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 0$, e $a_j \in \mathbb{C}$, para $j = 0, \dots, n$, com $\operatorname{grau}(p) = n$ (i.e., $a_n \neq 0$). Seja z_0 fixo em \mathbb{C} . Considere a função $P(z) = p(z + z_0)$.

(A) Mostre que P é um polinômio.

(B) Mostre que P e p tem mesmo grau e mesmo coeficiente dominante: a_n .

(C) Mostre que o termo independente de P é $p(z_0)$.

8. Mostre que $\left(\frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}\right)^3 = 1$ e $\left(\frac{\pm i \pm \sqrt{3}}{2}\right)^6 = -1$.

9. Mostre que se $m \in \mathbb{N}^*$ e q e r são o quociente e o resto da divisão inteira de m por 4 (isto é, $m = 4q + r$, $0 \leq r \leq 3$), então $i^m = i^r$. Compute:

$$(a) i^{55} \quad (b) i^{1041} \quad (c) i^{47} \quad (d) 1 + i + i^2 + \dots + i^{2014}.$$

10. Seja $M_2(\mathbb{R})$ o anel das matrizes quadradas de ordem 2 com coeficientes reais, munido das operações usuais de adição e multiplicação.

Considere $\mathbb{M} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \text{ com } a, b \in \mathbb{R} \right\}$. Mostre que a função

$$\varphi : a + ib = z \in \mathbb{C} \mapsto \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \in \mathbb{K}$$

é isomorfismo de corpos e de \mathbb{R} -espaços vetoriais. Isto é, φ é bijetora e satisfaz

$$\varphi(z+w) = \varphi(z) + \varphi(w), \quad \varphi(zw) = \varphi(z)\varphi(w) \quad \text{e} \quad \varphi(rw) = r\varphi(w) \quad \text{se } r \in \mathbb{R}.$$

11. Dadas as sequências $(z_k)_{1 \leq k \leq n}$ e $(w_k)_{1 \leq k \leq n}$, de números complexos, prove:

$$(\text{Desigualdade de Cauchy}) \quad \left| \sum_{k=1}^n z_k \overline{w_k} \right|^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n |z_k|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n |w_k|^2 \right).$$

Dica: Inicie com o caso $n = 2$.

12. Desenhe a região do plano determinada por

$$(a) \quad \left| \frac{z+1}{z-1} \right| \leq 1 \quad (b) \quad \operatorname{Re} \left(\frac{z+1}{z-1} \right) = 0 \quad (c) \quad |z+1| = 2|z|.$$

13. Dados $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, $z_1 \neq z_2$ e $a \in \mathbb{R}_+^*$, desenhe o conjunto:

$$\{z : |z - z_1| + |z - z_2| = 2a\}, \text{ com a condição } 2a > |z_1 - z_2|.$$

14. Seja $z = a + ib \in \mathbb{C}$, com a e b em \mathbb{R} . Definamos a função $| \cdot |_1 : \mathbb{C} \mapsto \mathbb{R}$ por,

$$|z|_1 = |a| + |b|.$$

Mostre que tal função é uma norma (sobre \mathbb{C}). Isto é,

- $|z|_1 \geq 0$, para todo z em \mathbb{C} , e $|z|_1 = 0$ se e somente se $z = 0$.
- $|\lambda z|_1 = |\lambda| |z|_1$, para quaisquer $z \in \mathbb{C}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$.
- $|z + w|_1 \leq |z|_1 + |w|_1$, para quaisquer z em \mathbb{C} e w em \mathbb{C} .

Seja a, b, c e d quatro números reais arbitrários. Mostre que

$$(A) \quad (|a| + |b|)^2 (|c| + |d|)^2 \leq 4[|ac - bd| + |ad + bc|]^2$$

$$(B) \quad |ac - bd| + |ad + bc| \leq (|a| + |b|)(|c| + |d|).$$

Sejam $z = a + ib$ e $w = c + id$. Mostre que

$$(C) \quad |\bar{z}|_1 = |z|_1 \quad \text{e} \quad \frac{|z|_1 |w|_1}{2} \leq |zw|_1 \leq |z|_1 |w|_1.$$

15. Seja $p(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n$, com $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 0$, e $a_j \in \mathbb{C}$, para $j = 0, \dots, n$. Seja z_0 fixo em \mathbb{C} . Mostre que existem coeficientes b_0, \dots, b_n em \mathbb{C} tais que

$$p(z) = b_0 + b_1(z - z_0) + \dots + b_n(z - z_0)^n, \text{ para todo } z \in \mathbb{C}.$$

Dica: $p(z) = p(z - z_0 + z_0)$.

16. A derivada (formal) de um polinômio $p(X) = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0$ é

$$p'(X) = n a_n X^{n-1} + (n-1) a_{n-1} X^{n-2} + \dots + a_1.$$

Seja α em \mathbb{C} . Utilizando somente derivadas formais, mostre que

- (A) α é raiz simples de $p(X)$ se e só se $p(\alpha) = 0$ e $p'(\alpha) \neq 0$.
- (B) α é raiz dupla de $p(X)$ se e só se $p(\alpha) = p'(\alpha) = 0$ e $p''(\alpha) \neq 0$.
- (C) α é raiz de multiplicidade k ($k \leq n$) de $p(X)$ se e só se

$$p(\alpha) = p'(\alpha) = \dots = p^{(k-1)}(\alpha) = 0 \text{ e } p^{(k)}(\alpha) \neq 0.$$

- (D) (Fórmula de Taylor) $p(X) = p(\alpha) + p'(\alpha)(X - \alpha) + \dots + \frac{p^{(n)}(\alpha)}{n!}(X - \alpha)^n$.
-

17. Sejam X e Y dois subconjuntos de \mathbb{R} , não vazios e arbitrários (limitados ou não). Definamos $X + Y = \{x + y : x \in X \text{ e } y \in Y\}$ e $-X = \{-x : x \in X\}$. Verifique:

- (a) Se $X \subset Y$, então $\inf Y \leq \inf X \leq \sup X \leq \sup Y$.
 - (b) Admita $x \leq y$, para arbitrários $x \in X$ e $y \in Y$. Prove $\sup X \leq \inf Y$.
 - (c) $\sup X + \sup Y = \sup(X + Y)$, onde $\sup X = +\infty$ se X ilimitado superiormente.
 - (d) $\inf(-X) = -\sup X$ e $\sup(-X) = -\inf X$.
18. Seja (x_n) uma sequência real (limitada ou não). Verifique as afirmações abaixo.

- (a) $\liminf(-x_n) = -\limsup x_n$ e $\limsup(-x_n) = -\liminf x_n$.
- (b) Suponha (x_n) limitada. Então, dado $\epsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ para o qual temos $\liminf x_n - \epsilon \leq x_n \leq \limsup x_n + \epsilon$, para todo $n \geq N$.
- (c) $\limsup x_n$ é valor de aderência de (x_n) , e é o maior valor de aderência.
- (d) $\lim x_n = L \in [-\infty, +\infty]$ se e somente se $\liminf x_n = \limsup x_n = L$.

Dicas. Para (b), prove uma das desigualdades e use (a). Para (c) e (d), use (b).

19. Sejam (x_n) e (y_n) sequências limitadas em \mathbb{R} . Mostre que

$$\liminf x_n + \liminf y_n \leq \liminf(x_n + y_n) \leq \limsup(x_n + y_n) \leq \limsup x_n + \limsup y_n.$$

As desigualdades afirmadas podem ser estritas. Dê exemplos.

20. Sejam (x_n) e (y_n) sequências em \mathbb{R} , com $\lim x_n = x \in \mathbb{R}$. Então, valem as identidades $\limsup(x_n + y_n) = x + \limsup y_n$ e $\liminf(x_n + y_n) = x + \liminf y_n$.

21. Seja (x_n) uma sequência real limitada. Verifique.

- (a) $\inf_{n \geq i} x_n \leq \inf_{n \geq i+1} x_n \leq x_{i+j+1} \leq \sup_{n \geq j+1} x_n \leq \sup_{n \geq j} x_n$, para todos $i \in \mathbb{N}$ e $j \in \mathbb{N}$.
 - (b) $-\infty < \liminf_{i \rightarrow +\infty} x_n \leq \limsup_{j \rightarrow +\infty} x_n < +\infty$.
 - (c) Defina $m = \liminf_{i \rightarrow +\infty} x_n$ e $M = \limsup_{j \rightarrow +\infty} x_n$. Seja L um valor de aderência da sequência (x_n) . Então, é válida a desigualdade $m \leq L \leq M$. Sugestão: considere uma subsequência $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ convergindo a L .
 - (d) Os números m e M são valores de aderência de (x_n) .
Dica: $m_i = \inf_{n \geq i} x_n$, $i \in \mathbb{N}$, é crescente e converge a m , e $m = \sup\{m_i : i \in \mathbb{N}\}$.
 - (e) Conclua que $\liminf_{i \rightarrow +\infty} x_n = \underline{\lim}_{n \geq i} x_n$ e $\limsup_{j \rightarrow +\infty} x_n = \overline{\lim}_{n \geq j} x_n$.
-

22. (**Weierstrass**) Seja K um conjunto compacto em \mathbb{R}^n e $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Mostre que f assume máximo e mínimo sobre K .

23* Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, +\infty)$ contínua e tal que $f(X) \rightarrow +\infty$ se $|X| \rightarrow +\infty$. Mostre que f assume um valor mínimo absoluto em algum ponto X_0 no plano \mathbb{R}^2 .

24* Todo conjunto aberto em \mathbb{R} é reunião enumerável disjunta de intervalos abertos.

25* Defina continuidade uniforme para uma função $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, com X contido em \mathbb{R} ou \mathbb{R}^2 . Mostre que se X é compacto e f é contínua, então f é uniformemente contínua.

26** Seja $f : [a, b] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, com $f(x, y)$ e $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ contínuas. Mostre que a função

$$\varphi(x) = \int_0^1 f(x, y) dy, \text{ onde } x \in [a, b],$$

é derivável, com derivada contínua (i.e., φ é de classe C^1), e

$$(\text{Regra de Leibnitz}) \quad \varphi'(x) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dy, \text{ para todo } x \in [a, b]$$

Dica 1. As integrais citadas existem e

$$\frac{\varphi(x+h) - \varphi(x)}{h} = \int_0^1 \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} dy.$$

Pelo TVM existe \bar{x} entre x e $x+h$ tal que

$$\frac{\varphi(x+h) - \varphi(x)}{h} - \int_0^1 f_x(x, y) dy = \int_0^1 [f_x(\bar{x}, y) - f_x(x, y)] dy.$$

A função contínua f_x é uniformemente contínua e dado $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|f_x(x_2, y_2) - f_x(x_1, y_1)| < \epsilon$ se $|(x_2, y_2) - (x_1, y_1)| < \delta$. Logo, supondo que o incremento h satisfaça $|h| < \delta$, temos $|f_x(\bar{x}, y) - f_x(x, y)| < \epsilon$ e então $\left| \frac{\varphi(x+h) - \varphi(x)}{h} - \int_0^1 f_x(x, y) dy \right| < \epsilon$. Deduza então a fórmula na regra de Leibnitz. Por fim, utilizando que a função $f_x(x, y)$ é uniformemente contínua, conclua que a função $x \mapsto \int_0^1 f_x(x, y) dy$ é contínua.

Dica 2. Vide Spivak, Cálculo em Variedades, Editora Ciência Moderna, p. 71.