

MAT0501 E MAT5734 - ANEIS E MÓDULOS

Prof: Juan Carlos Gutiérrez Fernández

Seja A um domínio de ideais principais.

Teorema 1. *Se $B \in M_{m \times n}(A)$ então existem $P \in M_m(A)$ e $Q \in M_n(A)$ invertíveis, tal que $PBQ = \text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_k, 0, \dots, 0\}$ onde os d_i são não nulos e $d_1 | d_2 \cdots | d_k$.*

Teorema 2. *Seja L um A -módulo livre de posto n e N um submódulo de L . Então existe uma base $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ de L e elementos em A não nulos a_1, \dots, a_k tal que $a_1 | a_2 \cdots | a_k$ e $\{a_1 y_1, a_2 y_2, \dots, a_k y_k\}$ é uma base de N .*

Exercícios. (Para 1/10/2018)

1. Prove Teorema 2 usando Teorema 1.
2. Prove Teorema 1 usando Teorema 2.
3. Seja M é um A -módulo de torção finitamente gerado. Prove, usando Teorema 1, que M é soma direta de submódulos cíclicos M_i ,

$$M = M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_k$$

tais que $\text{ann}(M_1) \supseteq \text{ann}(M_2) \supseteq \cdots \supseteq \text{ann}(M_k)$.

4. Assuma $\text{ann}(M) = (ab)$ com a e b primos entre si. Então

$$M = M_a \oplus M_b.$$

Obs:

$$\text{ann}(M) := \{c \in A \mid cx = 0 \text{ para todo } x \in M\},$$

$$M_c := \{x \in M \mid cx = 0\}.$$