

MAT 1352 - Cálculo II - IFUSP
Segundo semestre de 2016
 Prof. Oswaldo Rio Branco de Oliveira

TABELA TRIGONOMÉTRICA

Verifique as fórmulas abaixo, assumindo ou a fórmula 1 ou a 2. A 3 é útil para a prova das propriedades de reflexão das cônicas : parábola, elipse e hipérbole. As fórmulas 4 a 11 surgem em mudanças de variáveis no cômputo de integrais diversas. As fórmulas 12 (prostaférese), 13 e 14 surgem em situações várias, especialmente no estudo de séries de Fourier. A 15 é apropriada para uma rotação de eixos, dada a equação de uma quádrica.

1. $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta$
2. $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta$
3. $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta}$
4. $\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$
5. $\operatorname{cosec}^2 \theta = 1 + \operatorname{cotg}^2 \theta$
6. $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$
7. $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$
8. $\cos^2 \theta = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\theta$
9. $\sin^2 \theta = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2\theta$
10. $\sin\theta = \frac{2\tan\frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2\frac{\theta}{2}}, \text{ se } \cos\frac{\theta}{2} \neq 0$
11. $\cos\theta = \frac{1 - \tan^2\frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2\frac{\theta}{2}}, \text{ se } \cos\frac{\theta}{2} \neq 0$
12. Fórmulas de prostaférese (transformam produto em adição ou subtração):
 - (a) $\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$
 - (b) $\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$
 - (c) $\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$
13. $\sin p - \sin q = 2\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)$
14. $\cos p - \cos q = -2\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)$
15. $\cos^2 \theta = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\operatorname{cotg} 2\theta}{\sqrt{1+\operatorname{cotg}^2 2\theta}}\right).$

TABELA DE DERIVADAS

1. $f(x) = x^n \implies f'(x) = nx^{n-1}$, para todo $x \in \mathbb{R}$, para todo $n \in \mathbb{N}$
2. $f(x) = x^\alpha \implies f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$, para todo $x > 0$, para todo $\alpha \in \mathbb{R}$
3. $\sin' x = \cos x$
4. $\cos' x = -\sin x$
5. $\tan' x = \sec^2 x$
6. $\sec' x = \sec x \tan x$
7. $\cotg' x = -\operatorname{cosec}^2 x$
8. $\operatorname{cosec}' x = -\operatorname{cosec} x \cot x$
9. $f(x) = e^x \implies f'(x) = e^x$
10. $\ln' x = \frac{1}{x}, \forall x > 0$
11. $\arctan' x = \frac{1}{1+x^2}$
12. $\arcsen' x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, x \in (-1, +1)$
13. $\sinh' x = \cosh x$
14. $\cosh' x = \sinh x.$

Regras de Derivação

1. $(f + g)' = f' + g'$
2. $(cf)' = cf'$, se c é uma constante
3. $(fg)' = f'g + fg'$
4. $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
5. $(f \circ g)'(p) = f'(g(p)) \cdot g'(p)$ (Regra da Cadeia).

Fórmulas Úteis de Derivação

1. $[e^{f(x)}]' = e^{f(x)} f'(x)$
2. $[\ln f(x)]' = \frac{f'(x)}{f(x)}$
3. $[f(x)^\alpha]' = \alpha f(x)^{\alpha-1} f'(x)$
5. $[a^x]' = a^x \ln a, a > 0$ e $a \neq 1$
4. $[f(x)^{g(x)}]' = f(x)^{g(x)} [g(x) \ln f(x)]'.$