

# MAT 220 — Cálculo Diferencial e Integral IV

Prof. Paolo Piccione

## Prova SUB

05 de dezembro de 2019

Nome: \_\_\_\_\_

Número USP: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

### Instruções

- A duração da prova é de **duas horas**.
- Assinale as alternativas corretas na **folha de respostas** que está no final da prova. *É permitido deixar questões em branco.*
- Cada questão tem apenas **uma resposta correta**.
- O valor total da prova é de **10** pontos; cada questão correta vale  $\frac{1}{2}$  ponto (0.5) e *cada questão errada implica num desconto de  $\frac{1}{10}$  de ponto (0.10).*
- No final da prova, deve ser entregue apenas a folha de respostas (na última página).
- **Boa Prova!**

### Terminologia e Notações Utilizadas na Prova

- O corpo dos números complexos é denotado por  $\mathbb{C}$ . A *unidade imaginária* é denotada por  $i$ . Dado um número complexo  $z \in \mathbb{C}$ , a *parte real* e a *parte imaginária* de  $z$  são denotadas respectivamente por  $\Re(z)$  e  $\Im(z)$ . Assim,  $z = \Re(z) + i\Im(z)$ .
- Dado um número complexo  $z_0$  e um número positivo  $R$ ,  $D(z_0; R)$  denota o disco aberto centrado em  $z_0$  e de raio  $R$ , e  $\overline{D(z_0; R)}$  denota o disco fechado. O símbolo  $D(z_0; R)^*$  denota o conjunto  $D(z_0; R) \setminus \{z_0\}$ .
- Dado  $z_0 \in \mathbb{C}$ , e  $0 \leq \rho_1 < \rho_2$ ,  $A(z_0; \rho_1, \rho_2)$  denota o anel aberto  $\{z \in \mathbb{C} : \rho_1 < |z - z_0| < \rho_2\}$ .
- Dada uma função holomorfa  $f: D(a; R)^* \rightarrow \mathbb{C}$  com uma singularidade isolada em  $a$ ,  $\text{res}(f; a)$  é o *resíduo* de  $f$  em  $a$ .

***NÃO ESQUEÇA DE POR SEU NOME  
NA FOLHA DE RESPOSTAS!!!***

**B**

**Questão 1.** Qual é o conjunto  $S$  das singularidades da função  $f$  abaixo e a qual é a classificação dessas singularidades?

$$f(z) = \frac{1}{\sin z}$$

- (a)  $S = \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ , as singularidades são essenciais;
- (b)  $S = \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ , as singularidades são removíveis;
- (c)  $S = \{2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ , as singularidades são removíveis;
- (d)  $S = \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ , as singularidades são polos simples;
- (e)  $S = \{2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ , as singularidades são polos simples.

**Questão 2.** Sejam  $p, q$  inteiros positivos. Classifique as singularidades da função  $f$  abaixo:

$$\frac{z^p}{1 - z^q}$$

- (a) todas as singularidades são polos simples;
- (b) todas as singularidades são essenciais;
- (c) há uma singularidade removível e  $(q - 1)$  polos simples;
- (d) há um polo simples e  $(q - 1)$  singularidades removíveis;
- (e) todas singularidades são removíveis.

**Questão 3.** Qual é o raio de convergência  $R$  da série de potências abaixo?

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{2n+2}} z^{4n+1}$$

*Sugestão:*  $\frac{z^{4n+1}}{3^{2n+2}} = \frac{z}{9} \left(\frac{z^4}{9}\right)^n$ .

- (a)  $R = 3\sqrt{3}$ ;
- (b)  $R = 1/3$ ;
- (c)  $R = 1/\sqrt{3}$ ;
- (d)  $R = 3$ ;
- (e)  $R = \sqrt{3}$ .

**Questão 4.** Calcule o raio de convergência da série de potências

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} 4^n \frac{2n^2}{3n+1} (z - i)^n.$$

- (a)  $R = +\infty$ ;
- (b)  $R = \frac{1}{3}$ ;
- (c)  $R = 3$ ;
- (d)  $R = 0$ ;
- (e)  $R = \frac{1}{4}$ .

**Questão 5.** Calcule

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2 + 1)^2} dx.$$

- (a)  $\frac{\pi}{4}$ ;
- (b)  $\pi$ ;
- (c)  $\frac{3\pi}{2}$ ;
- (d)  $\frac{\pi}{2}$ ;
- (e)  $2\pi$ .

**Questão 6.** Obtenha a série de Taylor de  $f$  centrada em  $z_0 = 2$ , onde

$$f(z) = \frac{1}{z^2}.$$

- (a)  $\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) \left(\frac{z-2}{2}\right)^n$ ;
- (b)  $\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n \left(\frac{z-2}{4}\right)^n$ ;
- (c)  $\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n \left(\frac{z-2}{2}\right)^n$ ;
- (d)  $\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) \left(\frac{z-2}{4}\right)^n$ ;
- (e)  $\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) \left(\frac{z-2}{2}\right)^n$ .

**Questão 7.** Calcule

$$\int_{S^1} \frac{1}{z^2 - 2} dz$$

onde  $S^1$  é o círculo centrado em 0, de raio 1, e orientado positivamente.

- (a)  $-2\pi i$ ;
- (b) 0;
- (c)  $4\pi i$ ;
- (d)  $2\pi i$ ;
- (e)  $-4\pi i$ .

**Questão 8.** Qual é o conjunto dos pontos nos quais a função abaixo admite derivada complexa?

$$f(x + iy) = x^2 + iy^2$$

- (a)  $\{t + it : t \in \mathbb{R}\}$ ;
- (b)  $\mathbb{C}$ ;
- (c)  $\{t - it : t \in \mathbb{R}\}$ ;
- (d)  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ ;
- (e)  $\emptyset$ .

**Questão 9.** Em qual anel é convergente a expansão de Laurent da função  $f(z) = \frac{e^z}{(z^2 + 1)(z - 3)}$  centrada em  $z_0 = 3$ ?

- (a)  $\mathbb{C} \setminus \{1, -1, 3\}$ ;
- (b)  $\{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - 3| < 4\}$ ;
- (c)  $\{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - 3| < \sqrt{10}\}$ ;
- (d)  $\{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - i| < 4\}$ ;
- (e)  $\mathbb{C} \setminus \{i, -i, 3\}$ .

**Questão 10.** Obtenha a série de Laurent que converge em  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$  para a função abaixo

$$f(z) = z^2 \sin\left(\frac{1}{z^2}\right).$$

- (a)  $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!} \frac{1}{z^{4n}}$ ;
- (b)  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \frac{1}{z^{4n}}$ ;
- (c)  $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \frac{1}{z^{4n}}$ ;
- (d)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \frac{1}{z^{4n}}$ ;
- (e)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n)!} \frac{1}{z^{4n}}$ .

**Questão 11.** Calcule o valor principal de  $i^{4i}$ .

- (a)  $e^{2\pi}$ ;
- (b)  $e^{-2\pi}$ ;
- (c)  $e^{-\pi}$ ;
- (d)  $e^{-2i\pi}$ ;
- (e)  $e^\pi$ .

**Questão 12.** Qual das alternativas é um conjugado harmônico da função abaixo?

$$u(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

- (a)  $v(x, y) = \frac{2x}{x^2 + y^2};$
- (b)  $v(x, y) = -\frac{2x}{x^2 + y^2};$
- (c)  $v(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2};$
- (d)  $v(x, y) = -\frac{x}{x^2 + y^2};$
- (e)  $v(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}.$

**Questão 13.** Quantas raízes o polinômio abaixo possui no disco aberto  $D(0; 1)$ ?

$$g(z) = z^7 + 7z^3 + 4z + 1$$

**Sugestão:** use o Teorema de Rouché, com  $f(z) = 7z^3$ .

- (a) 2;
- (b) 7;
- (c) 3;
- (d) 1;
- (e) 0.

**Questão 14.** Calcule a derivada terceira  $f'''(1 + i)$  da função

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n^3 (z - 1 - i)^{n+1}.$$

- (a) 48;
- (b) -9;
- (c) -54;
- (d) 54;
- (e) 9.

**Questão 15.** Calcule

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{4}{(x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)} dx.$$

**Sugestão:** Denote por  $f(z) = \frac{4}{(z^2 - 2z + 2)(z^2 + 2z + 2)}$ ; pode utilizar os seguintes limites:

$$\begin{aligned}\lim_{z \rightarrow 1-i} (z - 1 + i)f(z) &= -\frac{1-i}{4}, & \lim_{z \rightarrow 1+i} (z - 1 - i)f(z) &= -\frac{1+i}{4}, \\ \lim_{z \rightarrow -1-i} (z + 1 + i)f(z) &= \frac{1+i}{4}, & \lim_{z \rightarrow -1+i} (z + 1 - i)f(z) &= \frac{1-i}{4}.\end{aligned}$$

- (a)  $4\pi$ ;
- (b)  $\frac{\pi}{4}$ ;
- (c)  $2\pi$ ;
- (d)  $\frac{\pi}{2}$ ;
- (e)  $\pi$ .

**Questão 16.** Determine  $\text{res}(f; 0)$ , onde

$$f(z) = 6z^5 e^{1/z^2}.$$

- (a)  $\frac{1}{6}$ ;
- (b) 1;
- (c) 0;
- (d) 2;
- (e) 6.

**Questão 17.** Classifique a singularidade 0 da função abaixo

$$f(z) = \frac{1 - z^2 - \cos z}{z^2}.$$

- (a) singularidade removível;
- (b) polo de ordem 2;
- (c) polo de ordem 3;
- (d) singularidade essencial;
- (e) polo simples (de ordem 1).

**Questão 18.** Calcule

$$\int_C \frac{\cos z}{z(z^2 + 8)} dz,$$

onde  $C$  é o quadrado de vértices  $(-2 - 2i), (2 - 2i), (2 + 2i), (-2 + 2i)$  orientado em sentido anti-horário.

- (a) 0;
- (b)  $\frac{\pi i}{4}$ ;
- (c)  $\frac{\pi i}{2}$ ;
- (d)  $2\pi i$ ;
- (e)  $\pi i$ .

**Questão 19.** Se  $a$  é um polo de ordem 2 da função holomorfa

$$f: D(a; R)^* \rightarrow \mathbb{C}$$

e  $h(z) = (z - a)^2 f(z)$ , qual é a fórmula correta para o resíduo da  $f$  em  $a$ ?

- (a)  $\text{res}(f; a) = \lim_{z \rightarrow a} (z - a)h(z)$ ;
- (b)  $\text{res}(f; a) = \lim_{z \rightarrow a} (z - a)f(z)$ ;
- (c)  $\text{res}(f; a) = \frac{1}{2}h'(a)$ ;
- (d)  $\text{res}(f; a) = h'(a)$ ;
- (e)  $\text{res}(f; a) = \frac{1}{2}h''(a)$ .

**Questão 20.** Determine a função  $f$  que é igual à seguinte série de potências num disco aberto centrado em  $z_0 = 0$ :

$$\sum_{n=1}^{\infty} nz^n$$

- (a)  $f(z) = -\frac{1}{(1-z)^2}$ ;
- (b)  $f(z) = \frac{1}{(1-z)^2}$ ;
- (c)  $f(z) = \frac{1}{1-z}$ ;
- (d)  $f(z) = \frac{z}{(1-z)^2}$ ;
- (e)  $f(z) = -\frac{z}{(1-z)^2}$ .

MAT 220 — Cálculo Diferencial e Integral IV

Prof. Paolo Piccione

Prova SUB

05 de dezembro de 2019

Nome: \_\_\_\_\_

Número USP: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Folha de Respostas B**

<b>1</b>	a	b	c	d	e
<b>2</b>	a	b	c	d	e
<b>3</b>	a	b	c	d	e
<b>4</b>	a	b	c	d	e
<b>5</b>	a	b	c	d	e
<b>6</b>	a	b	c	d	e
<b>7</b>	a	b	c	d	e
<b>8</b>	a	b	c	d	e
<b>9</b>	a	b	c	d	e
<b>10</b>	a	b	c	d	e
<b>11</b>	a	b	c	d	e
<b>12</b>	a	b	c	d	e
<b>13</b>	a	b	c	d	e
<b>14</b>	a	b	c	d	e
<b>15</b>	a	b	c	d	e
<b>16</b>	a	b	c	d	e
<b>17</b>	a	b	c	d	e
<b>18</b>	a	b	c	d	e
<b>19</b>	a	b	c	d	e
<b>20</b>	a	b	c	d	e

Deixe em branco.

Corretas	Erradas	Nota