

MAT 112 — Turma 2017146 e 2017134

Vetores e Geometria

Prof. Paolo Piccione

Prova SUB

05 de julho de 2018

Nome: \_\_\_\_\_

Número USP: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**InSTRUÇÕES**

- A duração da prova é de **uma hora e quarenta minutos**.
- Assinale as alternativas corretas na **folha de respostas** que está no final da prova. *É permitido deixar questões em branco.* Cada questão tem apenas **uma resposta correta**.
- O valor total da prova é de **10** pontos; cada questão correta vale  $\frac{1}{2}$  ponto (0.5) e, **caso houver mais de três respostas erradas, cada questão errada implica num desconto de  $\frac{1}{10}$  de ponto (0.10)**.
- No final da prova, deve ser entregue apenas a folha de respostas (na última página).
- A nota da SUB vai substituir a menor das notas das provas P1 e P2 no cálculo da média final (mesmo no caso em que a nota da SUB seja mais baixa da nota menor entre P1 e P2). É permitido sair da sala sem entregar a folha de respostas, como se o aluno não tivesse se apresentado para a prova.

**Terminologia e Notações Utilizadas na Prova**

- $\mathbb{E}^2$  e  $\mathbb{E}^3$  denotam respeitivamente o plano e o espaço euclidiano. Onde não especificado diversamente, todos os sistemas de coordenadas em  $\mathbb{E}^2$  e em  $\mathbb{E}^3$  são ortonormais.
- Dados vetores  $\vec{v}$  e  $\vec{w}$ , o produto vetorial de  $\vec{v}$  e  $\vec{w}$  é denotado por  $\vec{v} \times \vec{w}$ , e o produto escalar de  $\vec{v}$  e  $\vec{w}$  é  $\vec{v} \cdot \vec{w}$ . O comprimento (norma) do vetor  $\vec{v}$  é denotado por  $\|\vec{v}\|$ .

***NÃO ESQUEÇA DE POR SEU NOME  
NA FOLHA DE RESPOSTAS!!!***

**C**

**Questão 1.** Considere o ponto  $A = (1, 2, 1)$  e a reta

$$r : \begin{cases} 3x + z = 3 \\ 2x + y = 2 \end{cases}$$

Ache a equação cartesiana do plano  $\pi$  que contém a reta  $r$  e o ponto  $A$ .

- (a)  $\pi : 4x + y + 2z = 5$ ;
- (b)  $\pi : 4x - y + 2z = 4$ ;
- (c)  $\pi : 4x - y - 2z = 3$ ;
- (d)  $\pi : 2x - y - 2z = 4$ ;
- (e)  $\pi : 3x - y + 2z = 2$ .

**Questão 2.** Dada a matriz  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ , seja  $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$  sua matriz inversa. Calcule  $b_{23}$ .

- (a) 2;
- (b) 0;
- (c)  $A$  não admite inversa;
- (d) -1;
- (e) 3.

**Questão 3.** Qual é a classe de congruência módulo 7 do inteiro -18?

- (a)  $[1]_7$ ;
- (b)  $[2]_7$ ;
- (c)  $[6]_7$ ;
- (d)  $[4]_7$ ;
- (e)  $[3]_7$ .

**Questão 4.** Determine a posição relativa das retas  $r$  e  $s$  dadas por:

$$r : (1, 1, -1) + \lambda(2, -1, 3) \quad \text{e} \quad s : (5, 1, 5) + \lambda\left(1, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

- (a)  $r$  e  $s$  são concorrentes,  $r \neq s$ ;
- (b)  $r \cap s$  é um círculo de raio  $\frac{1}{3}$ ;
- (c)  $r$  e  $s$  são reversas;
- (d)  $r$  e  $s$  são paralelas, e  $r \neq s$ ;
- (e)  $r = s$ .

**Questão 5.** Considere as retas

$$r_1 : \begin{cases} x = 3 + \lambda \\ y = 4 + \lambda \\ z = -1 - \lambda \end{cases} \quad e \quad r_2 : \begin{cases} x = 4 + s \\ y = -s \\ z = -1 - 3s, \end{cases} \quad \lambda, s \in \mathbb{R}.$$

Determine o plano  $\pi$  tal que:

$$\text{dist}(\pi, r_1) = \frac{1}{3} \text{dist}(r_1, r_2) \quad e \quad \text{dist}(\pi, r_2) = \frac{2}{3} \text{dist}(r_1, r_2).$$

- (a)  $\pi : 2x - y + z = 3$ ;
- (b)  $\pi : 2x - y + 5z = 6$ ;
- (c)  $\pi : 2x - 2y + z = 4$ ;
- (d)  $\pi : 2x - 4y + 5z = 5$ ;
- (e)  $\pi : 2x - 5y + z = 3$ .

**Questão 6.** Sejam  $P = (1, 0, 1)$  e  $Q = (0, 1, 1)$ . Ache um ponto  $C$  da reta  $PQ$  tal que a área do triângulo  $ABC$  onde  $A = (3, -2, 1)$  e  $B = (0, 0, 1)$  seja  $\frac{1}{2}$ .

- (a)  $C = (2, -1, -1)$  ou  $C = (2, -2, 1)$ ;
- (b)  $C = (1, -1, 1)$  ou  $C = (4, 3, 1)$ ;
- (c)  $C = (1, -1, 1)$  ou  $C = (1, -3, 1)$ ;
- (d)  $C = (2, -1, 1)$  ou  $C = (4, -3, 1)$ ;
- (e)  $C = (2, 1, 1)$  ou  $C = (4, -3, -1)$ .

**Questão 7.** Calcule a distância  $d$  entre o ponto  $P = (2, 3)$  e o ponto médio do segmento com extremos  $A = (6, 0)$  e  $B = (0, 4)$ .

- (a)  $d = 3$ ;
- (b)  $d = \sqrt{2}$ ;
- (c)  $d = \sqrt{3}$ ;
- (d)  $d = 2$ ;
- (e)  $d = 0$ .

**Questão 8.** Calcule o produto triplo  $(\vec{v}_2 \times \vec{v}_1) \cdot \vec{v}_3$ , onde  $\vec{v}_1 = (2, -2, -1)_E$ ,  $\vec{v}_2 = (4, 3, 0)_E$  e  $\vec{v}_3 = (2, 0, 0)_E$ .

- (a)  $-3$ ;
- (b)  $0$ ;
- (c)  $3$ ;
- (d)  $-6$ ;
- (e)  $6$ .

**Questão 9.** Determine a equação da esfera  $S$  em  $\mathbb{E}^3$  com centro no ponto  $C = (1, -1, 2)$  e raio  $R = \sqrt{6}$

- (a)  $S : x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 2y + 4z = 0$ ;
- (b)  $S : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z = 0$ ;
- (c)  $S : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y + 2z = 6$ ;
- (d)  $S : x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y + 4z = 6$ ;
- (e)  $S : x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 4z = 0$ .

**Questão 10.** Calcule  $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \end{pmatrix}$ .

- (a)  $-2$ ;
- (b)  $-6$ ;
- (c)  $0$ ;
- (d)  $6$ ;
- (e)  $1$ .

**Questão 11.** Calcule a distância entre o ponto  $P_0 = (1, 2, -1)$  e o plano  $\pi : -2x + 4y - z + 1 = 0$ .

- (a)  $\frac{7}{\sqrt{21}}$ ;
- (b)  $\frac{8}{\sqrt{21}}$ ;
- (c)  $\frac{3}{\sqrt{5}}$ ;
- (d)  $\frac{2}{\sqrt{7}}$ ;
- (e)  $\frac{5}{\sqrt{3}}$ .

**Questão 12.** Determine os planos ortogonais ao vetor  $\vec{v} = (3, 2, -6)$  e tangentes à esfera  $S : x^2 + y^2 + z^2 - 2y = 0$ .

- (a)  $S$  não é uma esfera;
- (b)  $\pi_1 : 3x + 2y - 6z = 0$ ,  $\pi_2 : 3x + 2y - 6z + 5 = 0$ ;
- (c)  $\pi_1 : -3x - 2y + 6z + 5 = 0$ ,  $\pi_2 : -3x - 2y + 6z - 9 = 0$ ;
- (d) não existe nenhum plano ortogonal a  $\vec{v}$  e tangente a  $S$ ;
- (e)  $\pi_1 : 3x + 2y - 6z + 5 = 0$ ,  $\pi_2 : 3x + 2y - 6z - 9 = 0$ .

**Questão 13.** Seja  $S$  uma esfera de centro  $C = (3, 2, 1)$ , e suponha que o plano  $\pi : x + z + 1 = 0$  seja tangente a  $S$ . Calcule o raio de  $S$ .

- (a)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ;
- (b)  $\sqrt{3}$ ;
- (c)  $\frac{5}{\sqrt{2}}$ ;
- (d)  $\frac{3}{\sqrt{5}}$ ;
- (e)  $\frac{1}{\sqrt{3}}$ .

**Questão 14.** Determine o ângulo entre a reta  $X = (6, 7, 0) + (-2, -2, 0)\lambda$  e o plano  $X = (8, -4, 2) + \lambda \cdot (1, 0, -2) + \mu \cdot (1, -2, 0)$ .

- (a)  $\frac{\pi}{6}$ ;
- (b)  $\frac{\pi}{3}$ ;
- (c)  $\frac{\pi}{2}$ ;
- (d)  $\frac{2}{3}\pi$ ;
- (e)  $\frac{\pi}{4}$ .

**Questão 15.** Determine o valor da constante  $m$  para que seja de  $30^\circ$  o ângulo entre os planos:

$$\pi_1 : x + my + 2z - 7 = 0 \quad e \quad \pi_2 : 4x + 5y + 3z - 2 = 0.$$

- (a)  $m = 1$  ou  $m = 7$ ;
- (b)  $m = 5$  ou  $m = 7$ ;
- (c)  $m = \pm 3$ ;
- (d)  $m = \pm 5$ ;
- (e)  $m = -1$  ou  $m = 3$ .

**Questão 16.** Seja  $S$  uma esfera de centro  $C = (1, 1, 0)$ , e suponha que a interseção de  $S$  com o plano  $\pi : -3y + 4z = 2$  seja um círculo de raio  $r = 1$ . Calcule o raio  $R$  de  $S$ .

- (a)  $R = 2$ ;
- (b)  $R = \frac{1}{5}$ ;
- (c)  $R = \sqrt{2}$ ;
- (d)  $R = \frac{1}{2}$ ;
- (e)  $R = \frac{1}{\sqrt{3}}$ .

**Questão 17.** Considere a cônica de equação  $8x^2 - 2xy + 8y^2 - 63 = 0$  em  $\mathbb{E}^2$ . Sejam  $(u, v)$  coordenadas ortonormais no plano obtidas por uma rotação de um ângulo  $\theta$  do sistema de coordenadas  $(x, y)$ . Assuma que no sistema de coordenadas  $(u, v)$  a equação da cônica seja da forma  $Au^2 + Bv^2 + C = 0$ . Qual das escolhas abaixo é um possível  $\theta$ ?

- (a)  $\theta = \frac{\pi}{6}$ ;
- (b)  $\theta = \xi$ ;
- (c)  $\theta = \frac{\pi}{4}$ ;
- (d)  $\theta = \frac{\pi}{2}$ ;
- (e)  $\theta = \frac{\pi}{3}$ .

**Questão 18.** Indique que letra é:  $\xi$

- (a) “cri” (grego);
- (b) “ubataba” (tupi-guarani);
- (c) hiperoglífico que representa a cobra (egípcio);
- (d) “chi” (grego) ;
- (e) “csi” (grego).

**Questão 19.** Seja  $B$  uma base de  $\mathbb{V}^3$ . Para quais valores da constante  $\lambda$  os vetores  $\vec{v}_1 = (\lambda, \lambda, 2)_B$ ,  $\vec{v}_2 = (\lambda, -1, -\lambda)_B$  e  $\vec{v}_3 = (2\lambda, 1, -\lambda)_B$  são linearmente dependentes?

- (a)  $\lambda = 0$ ;
- (b)  $\lambda = 0, \pm 1$ ;
- (c)  $\lambda = \pm\sqrt{5}$ ;
- (d)  $\lambda = 0, 1 \pm \sqrt{5}$ ;
- (e)  $\lambda = 0, 1 \pm \sqrt{7}$ .

**Questão 20.** Determine a posição relativa das esferas:

$$\begin{aligned} S_1 : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z &= 0, \\ S_2 : x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 2y + 2z + 2 &= 0. \end{aligned}$$

- (a)  $S_1$  está contida na parte interior de  $S_2$ , e  $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ ;
- (b)  $S_1$  está contida na parte interior de  $S_2$ , e é tangente a  $S_2$ ;
- (c)  $S_1$  está contida na parte interior de  $S_2$ , e  $S_1 \cap S_2$  é um círculo de raio  $r = \frac{1}{4}$ ;
- (d)  $S_1$  está contida na parte exterior de  $S_2$ , e  $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ ;
- (e)  $S_1$  está contida na parte exterior de  $S_2$ , e é tangente a  $S_2$ .

MAT 112  
Vetores e Geometria  
Prof. Paolo Piccione  
Prova SUB  
05 de julho de 2018

Nome (legível!!): \_\_\_\_\_

Número USP: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Folha de Respostas C**

Marque aqui sua turma:  2018146 (IME)  2018134 (IAG)

<b>1</b>	a	b	c	d	e
<b>2</b>	a	b	c	d	e
<b>3</b>	a	b	c	d	e
<b>4</b>	a	b	c	d	e
<b>5</b>	a	b	c	d	e
<b>6</b>	a	b	c	d	e
<b>7</b>	a	b	c	d	e
<b>8</b>	a	b	c	d	e
<b>9</b>	a	b	c	d	e
<b>10</b>	a	b	c	d	e
<b>11</b>	a	b	c	d	e
<b>12</b>	a	b	c	d	e
<b>13</b>	a	b	c	d	e
<b>14</b>	a	b	c	d	e
<b>15</b>	a	b	c	d	e
<b>16</b>	a	b	c	d	e
<b>17</b>	a	b	c	d	e
<b>18</b>	a	b	c	d	e
<b>19</b>	a	b	c	d	e
<b>20</b>	a	b	c	d	e

Deixe em branco.

Corretas	Erradas	Nota