Melhores momentos

AULA PASSADA

Ordenação por inserção

Algoritmo rearranja $A[1\,..\,n]$ em ordem crescente.

```
ORDENA-POR-INSERÇÃO (A, n)
1    para j ← 2 até n faça
2        chave ← A[j]

3        i ← j − 1
4        enquanto i ≥ 1 e A[i] > chave faça
5            A[i + 1] ← A[i]      ▷ desloca
6            i ← i − 1

7        A[i + 1] ← chave      ▷ insere
```

Invariantes

Correção de algoritmos iterativos e invariantes

Relação invariante chave:

(i0) na linha 1 vale que: $A[1\,..\,j-1]$ é crescente.



Supondo que a invariante vale. Correção do algoritmo é evidente!

No início da última iteração das linhas 1–7 tem-se que $j = n + 1$. Da invariante concluí-se que $A[1\,..\,n]$ é crescente.

Consumo de tempo

Se a execução de cada linha de código consome 1 unidade de tempo o consumo total é:

linha	todas as execuções da linha
1	$= \quad n$
2	$= \quad n-1$
3	$= \quad n-1$
4	$\leq \quad 2+3+\cdots+n \;=\; (n-1)(n+2)/2$
5	$\leq \quad 1+2+\cdots+(n-1) \;=\; n(n-1)/2$
6	$\leq \quad 1+2+\cdots+(n-1) \;=\; n(n-1)/2$
7	$= \quad n-1$
total	$\leq \quad (3/2)n^2+(7/2)n-4$

$(3/2)n^2 + (7/2)n - 4$ **versus** $(3/2)n^2$

n	$(3/2)n^2 + (7/2)n - 4$	$(3/2)n^2$
64	6364	6144
128	25020	24576
256	99196	98304
512	395004	393216
1024	1576444	1572864
2048	6298620	6291456
4096	25180156	25165824
8192	100691964	100663296
16384	402710524	402653184
32768	1610727420	1610612736

$(3/2)n^2$ domina os outros termos

Consumo de tempo

Se a execução da linha i consome t_i unidades de tempo, para $i = 1, \ldots, 7$, o consumo totalde tempo é:

linha	todas as execuções da linha	
1	$= \quad n$	$\times t_1$
2	$= \quad n-1$	$\times t_2$
3	$= \quad n-1$	$\times t_3$
4	$\leq \quad 2+3+\cdots+n \;=\; (n-1)(n+2)/2$	$\times t_4$
5	$\leq \quad 1+2+\cdots+(n-1) \;=\; n(n-1)/2$	$\times t_5$
6	$\leq \quad 1+2+\cdots+(n-1) \;=\; n(n-1)/2$	$\times t_6$
7	$= \quad n-1$	$\times t_7$

total	$\leq$	$((t_4+t_5+t_6)/2) \times n^2$
	$+$	$(t_1+t_2+t_3+t_4/2-t_5/2-t_6/2+t_7) \times n$
	$-$	$(t_2+t_3+t_4+t_7)$

Consumo de tempo

linha	todas as execuções da linha	
1	$= \quad n$	$\times t_1$
2	$= \quad n-1$	$\times t_2$
3	$= \quad n-1$	$\times t_3$
4	$\leq \quad 2+3+\cdots+n \;=\; (n-1)(n+2)/2$	$\times t_4$
5	$\leq \quad 1+2+\cdots+(n-1) \;=\; n(n-1)/2$	$\times t_5$
6	$\leq \quad 1+2+\cdots+(n-1) \;=\; n(n-1)/2$	$\times t_6$
7	$= \quad n-1$	$\times t_7$
total	$\leq \quad c_2 \times n^2 + c_1 \times n + c_0$	

c_2, c_1, c_0 são constantes que dependem da máquina.

n^2 é para sempre! Está nas entranhas do algoritmo!

Chão e teto

$\lfloor x \rfloor$:= inteiro i tal que $i \leq x < i + 1$

$\lceil x \rceil$:= inteiro j tal que $j - 1 < x \leq j$

Exercício A1.B

Mostre que

$$\frac{n-1}{2} \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \leq \frac{n}{2} \qquad \text{e} \qquad \frac{n}{2} \leq \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \leq \frac{n+1}{2}$$

para qualquer inteiro $n \geq 1$.

AULA 2

Notação assintótica

CLRS 3.1

AU 3.4, p.96–100 (muito bom!)

Funções de n

$5n^2 - 9n$ $\quad$ $4n + 8$ $\quad$ $\lfloor n/3 \rfloor + 4$ $\quad$ $2\sqrt{n} + 7$

2^{n-3} $\quad$ $\lg n \quad (= \log_2 n)$

Qual é maior: $n^2 - 9$ ou $4n + 8$?

Funções de n

$5n^2 - 9n$ $\quad$ $4n + 8$ $\quad$ $\lfloor n/3 \rfloor + 4$ $\quad$ $2\sqrt{n} + 7$

2^{n-3} $\quad$ $\lg n \quad (= \log_2 n)$

Qual é maior: $n^2 - 9$ ou $4n + 8$?

Depende do valor de n!

Funções de n

$5n^2 - 9n$ $\quad$ $4n + 8$ $\quad$ $\lfloor n/3 \rfloor + 4$ $\quad$ $2\sqrt{n} + 7$

2^{n-3} $\quad$ $\lg n \quad (= \log_2 n)$

Qual é maior: $n^2 - 9$ ou $4n + 8$?

Depende do valor de n!

Qual cresce mais?

Funções de n

$5n^2 - 9n$ $\quad$ $4n + 8$ $\quad$ $\lfloor n/3 \rfloor + 4$ $\quad$ $2\sqrt{n} + 7$

2^{n-3} $\quad$ $\lg n \quad (= \log_2 n)$

Qual é maior: $n^2 - 9$ ou $4n + 8$?

Depende do valor de n!

Qual cresce mais?

Comparação assintótica, ou seja, para n ENORME.

Funções de n

$5n^2 - 9n$ $\quad 4n + 8$ $\quad \lfloor n/3 \rfloor + 4$ $\quad 2\sqrt{n} + 7$

2^{n-3} $\quad \lg n \quad (= \log_2 n)$

Qual é maior: $n^2 - 9$ ou $4n + 8$?

Depende do valor de n!

Qual cresce mais?

Comparação assintótica, ou seja, para n ENORME.

$\lg n$ $\quad 2\sqrt{n} + 7$ $\quad \lfloor n/3 \rfloor + 4$ $\quad 4n + 8$ $\quad 5n^2 - 9n$

2^{n-3}

Notação O

Intuitivamente...

$\mathrm{O}(f(n))$ $\approx$ funções que não crescem mais rápido que $f(n)$

$\approx$ funções menores ou iguais a um múltiplo de $f(n)$

n^2 $\quad$ $(3/2)n^2$ $\quad$ $9999n^2$ $\quad$ $n^2/1000$ $\quad$ etc.

crescem todas com a mesma velocidade

Notação O

Intuitivamente...

$\mathrm{O}(f(n))$ $\approx$ funções que não crescem mais rápido que $f(n)$

$\approx$ funções menores ou iguais a um múltiplo de $f(n)$

n^2 $(3/2)n^2$ $9999n^2$ $n^2/1000$ etc.

crescem todas com a mesma velocidade

- $n^2 + 99n$ é $\mathrm{O}(n^2)$
- $33n^2$ é $\mathrm{O}(n^2)$
- $9n + 2$ é $\mathrm{O}(n^2)$
- $0{,}00001n^3 - 200n^2$ não é $\mathrm{O}(n^2)$

Definição

Sejam $T(n)$ e $f(n)$ funções dos inteiros nos reais. Dizemos que $T(n)$ é $\mathrm{O}(f(n))$ se existem constantes positivas c e n_0 tais que

$$T(n) \leq c\, f(n)$$

para todo $n \geq n_0$.



Mais informal

$T(n)$ é $\mathrm{O}(f(n))$ se existe $c > 0$ tal que

$$T(n) \leq c\, f(n)$$

para todo n suficientemente GRANDE.



Exemplos

$T(n)$ é $\mathrm{O}(f(n))$ lê-se "$T(n)$ é O de $f(n)$" ou
"$T(n)$ é da ordem de $f(n)$"

Exemplos

$T(n)$ é $\mathrm{O}(f(n))$ lê-se "$T(n)$ é O de $f(n)$" ou
"$T(n)$ é da ordem de $f(n)$"

Exemplo 1

Se $T(n) \leq 500 f(n)$ para todo $n \geq 10$, então $T(n)$ é $\mathrm{O}(f(n))$.

Exemplos

$T(n)$ é $\mathrm{O}(f(n))$ lê-se "$T(n)$ é O de $f(n)$" ou
"$T(n)$ é da ordem de $f(n)$"

Exemplo 1

Se $T(n) \leq 500 f(n)$ para todo $n \geq 10$, então $T(n)$ é $\mathrm{O}(f(n))$.

Prova: Aplique a definição com $c = 500$ e $n_0 = 10$.

Exemplos

$T(n)$ é $\mathrm{O}(f(n))$ lê-se "$T(n)$ é O de $f(n)$" ou
"$T(n)$ é da ordem de $f(n)$"

Exemplo 1

Se $T(n) \leq 500 f(n)$ para todo $n \geq 10$, então $T(n)$ é $\mathrm{O}(f(n))$.

Prova: Aplique a definição com $c = 500$ e $n_0 = 10$.

Exemplo 2

$10n^2$ é $\mathrm{O}(n^3)$.

Exemplos

$T(n)$ é $\mathrm{O}(f(n))$ lê-se "$T(n)$ é O de $f(n)$" ou
"$T(n)$ é da ordem de $f(n)$"

Exemplo 1

Se $T(n) \leq 500 f(n)$ para todo $n \geq 10$, então $T(n)$ é $\mathrm{O}(f(n))$.

Prova: Aplique a definição com $c = 500$ e $n_0 = 10$.

Exemplo 2

$10n^2$ é $\mathrm{O}(n^3)$.

Prova: Para $n \geq 0$, temos que $0 \leq 10n^2 \leq 10\, n^3$.

Outra prova: Para $n \geq 10$, temos $0 \leq 10n^2 \leq n \times n^2 = 1\, n^3$.

Mais exemplos

Exemplo 3

$\lg n$ é $\mathrm{O}(n)$.

Mais exemplos

Exemplo 3

$\lg n$ é $\mathrm{O}(n)$.

Prova: Para $n \geq 1$, tem-se que $\lg n \leq 1\, n$.

Mais exemplos

Exemplo 3

$\lg n$ é $\mathrm{O}(n)$.

Prova: Para $n \geq 1$, tem-se que $\lg n \leq 1\, n$.

Exemplo 4

$20n^3 + 10n \log n + 5$ é $\mathrm{O}(n^3)$.

Mais exemplos

Exemplo 3

$\lg n$ é $\mathrm{O}(n)$.

Prova: Para $n \geq 1$, tem-se que $\lg n \leq 1\, n$.

Exemplo 4

$20n^3 + 10n \log n + 5$ é $\mathrm{O}(n^3)$.

Prova: Para $n \geq 1$, tem-se que

$$20n^3 + 10n \lg n + 5 \leq 20n^3 + 10n^3 + 5n^3 = 35\, n^3.$$

Outra prova: Para $n \geq 10$, tem-se que

$$20n^3 + 10n \lg n + 5 \leq 20n^3 + n\, n \lg n + n \leq 20n^3 + n^3 + n^3 = 22\, n^3.$$

Mais exemplos ainda

Exemplo 5

$3 \lg n + \lg \lg n$ é $\mathrm{O}(\lg n)$.

Mais exemplos ainda

Exemplo 5

$3 \lg n + \lg \lg n$ é $\mathrm{O}(\lg n)$.

Prova: Para $n \geq 2$, tem-se que

$$3 \lg n + \lg \lg n \leq 3 \lg n + \lg n = 4 \lg n.$$

[Note que $\lg \lg n$ não é definida para $n = 1$.]

Mais exemplos ainda

Exemplo 5

$3 \lg n + \lg \lg n$ é $\mathrm{O}(\lg n)$.

Prova: Para $n \geq 2$, tem-se que

$$3 \lg n + \lg \lg n \leq 3 \lg n + \lg n = 4 \lg n.$$

[Note que $\lg \lg n$ não é definida para $n = 1$.]

Exemplo 6

10^{100} é $\mathrm{O}(1)$.

Mais exemplos ainda

Exemplo 5

$3 \lg n + \lg \lg n$ é $\mathrm{O}(\lg n)$.

Prova: Para $n \geq 2$, tem-se que

$$3 \lg n + \lg \lg n \leq 3 \lg n + \lg n = 4 \lg n.$$

[Note que $\lg \lg n$ não é definida para $n = 1$.]

Exemplo 6

10^{100} é $\mathrm{O}(1)$.

Prova: Para $n \geq 1$, tem-se que

$$10^{100} = 10^{100}\, n^0 = 10^{100} \times 1.$$

[Note que n não precisa aparecer, já que estamos lidando com funções constantes.]

Uso da notação O

$\mathrm{O}(f(n)) = \{T(n)$: existem c e n_0 tq $T(n) \leq cf(n), n \geq n_0\}$

"$T(n)$ é $\mathrm{O}(f(n))$" deve ser entendido como "$T(n) \in \mathrm{O}(f(n))$".

"$T(n) = \mathrm{O}(f(n))$" deve ser entendido como "$T(n) \in \mathrm{O}(f(n))$".

"$T(n) \leq \mathrm{O}(f(n))$" é feio.

"$T(n) \geq \mathrm{O}(f(n))$" não faz sentido!

"$T(n)$ é $g(n) + \mathrm{O}(f(n))$" significa que existe constantes positivas c e n_0 tais que

$$T(n) \leq g(n) + c\, f(n)$$

para todo $n \geq n_0$.

Nomes de classes O

classe	nome
$\mathrm{O}(1)$	constante
$\mathrm{O}(\lg n)$	logarítmica
$\mathrm{O}(n)$	linear
$\mathrm{O}(n \lg n)$	$n \log n$
$\mathrm{O}(n^2)$	quadrática
$\mathrm{O}(n^3)$	cúbica
$\mathrm{O}(n^k)$ com $k >= 1$	polinomial
$\mathrm{O}(2^n)$	exponencial
$\mathrm{O}(a^n)$ com $a > 1$	exponencial

Exercícios

Exercício 2.A

Prove que $n^2 + 10n + 20 = \mathrm{O}(n^2)$

Exercício 2.B

Prove que $300 = \mathrm{O}(1)$

Exercício 2.C

Prove que $\lceil n/3 \rceil = \mathrm{O}(n)$

É verdade que $n = \mathrm{O}(\lfloor n/3 \rfloor)$?

Exercício 2.D

Prove que $\lg n = \mathrm{O}(\log_{10} n)$

Exercício 2.E

Prove que $n = \mathrm{O}(2^n)$

Exercício 2.F

Prove que $\lg n = \mathrm{O}(n)$

Exercício 2.G

Prove que $n/1000$ não é $\mathrm{O}(1)$

Exercício 2.H

Prove que $\frac{1}{2}\, n^2$ não é $\mathrm{O}(n)$

Mais exercícios

Exercício 2.I

Suponha T definida para $n = 0, 1, \ldots$

Se $T(n) = \mathrm{O}(1)$, mostre que existe c' tal que $T(n) \leq c'$ para todo $n \geq 0$.

Se $T(n) = \mathrm{O}(n)$, mostre que existe c' tal que $T(n) \leq c'n$ para todo $n \geq 1$.

Exercício 2.J

Prove que $n^2 + 999n + 9999 = \mathrm{O}(n^2)$.

Exercício 2.K

Prove que $\frac{1}{2}n(n+1) = \mathrm{O}(n^2)$.

Exercício 2.L

É verdade que $\frac{1}{100}n^2 - 999n - 9999 = \mathrm{O}(n)$? Justifique.

Exercício 2.M

Suponha que $f(n) = n^2$ quando n é par e $f(n) = n^3$ quando n é ímpar.

É verdade que $f(n) = \mathrm{O}(n^2)$?

É verdade que $f(n) = \mathrm{O}(n^3)$?

É verdade que $n^2 = \mathrm{O}(f(n))$?

É verdade que $n^3 = \mathrm{O}(f(n))$?

Mais exercícios ainda

Exercício 2.N
É verdade que $n^2 = \mathrm{O}(2^n)$?

Exercício 2.O
É verdade que $\lg n = \mathrm{O}(\sqrt{n})$?

Exercício 2.P
Suponha $f(n) = 64n \lg n$ e $g(n) = 8n^2$, com n inteiro positivo.
Para que valores de n temos $f(n) \leq g(n)$?

Exercício 2.Q (bom!)
Suponha T e f definidas para $n = 1, 2, \ldots$ Mostre que se $T(n) = \mathrm{O}(f(n))$ e $f(n) > 0$ para $n \geq 1$ então existe c' tal que $T(n) \leq c' f(n)$ para todo $n \geq 1$.

Exercício 2.R (bom!)
Faz sentido dizer "$T(n) = \mathrm{O}(n^2)$ para $n \geq 3$"?

Mais exercícios ainda ainda

Exercício 2.S

É verdade que $2^n = \mathrm{O}(n)$?
É verdade que $n = \mathrm{O}(\lg n)$?
Justifique.

Exercício 2.T

É verdade que $n + \sqrt{n}$ é $\mathrm{O}(n)$?
É verdade que n é $\mathrm{O}(\sqrt{n})$?
É verdade que $n^{2/3}$ é $\mathrm{O}(\sqrt{n})$?
É verdade que $\sqrt{n} + 1000$ é $\mathrm{O}(n)$?

Exercício 2.U

É verdade que $\lg n = \mathrm{O}(n^{1/2})$?
É verdade que $\sqrt{n} = \mathrm{O}(\lg n)$?
É verdade que $\lg n = \mathrm{O}(n^{1/3})$?
Justifique. (Sugestão: prove, por indução, que $\lg x \leq x$ para todo número real $x \geq 1$.)

Exercício 2.V

É verdade que $\lceil \lg n \rceil = \mathrm{O}(\lg n)$?

Análise com notação O

CLRS 2.1–2.2

AU 3.3, 3.6 (muito bom)

Ordenação por inserção

Algoritmo rearranja $A[p\,..\,r]$ em ordem crescente

```
ORDENA-POR-INSERÇÃO (A, p, r)
1   para j ← p + 1 até r faça
2       chave ← A[j]
3       i ← j − 1
4       enquanto i ≥ p e A[i] > chave faça
5           A[i + 1] ← A[i]      ▷ desloca
6           i ← i − 1
7       A[i + 1] ← chave         ▷ insere
```

Quanto tempo o algoritmo consome?

Ordenação por inserção

Algoritmo rearranja $A[p\,..\,r]$ em ordem crescente

```
ORDENA-POR-INSERÇÃO (A, p, r)
1    para j ← p + 1 até r faça
2         chave ← A[j]
3         i ← j − 1
4         enquanto i ≥ p e A[i] > chave faça
5              A[i + 1] ← A[i]      ▷ desloca
6              i ← i − 1
7         A[i + 1] ← chave          ▷ insere
```

Quanto tempo o algoritmo consome?

"Tamanho" do problema: $n := r - p + 1$

Consumo de tempo

linha	consumo de todas as execuções da linha
1	?
2	?
3	?
4	?
5	?
6	?
7	?
total	?

Consumo de tempo

linha	consumo de todas as execuções da linha
1	$\mathrm{O}(n)$
2	$\mathrm{O}(n)$
3	$\mathrm{O}(n)$
4	$n\mathrm{O}(n) = \mathrm{O}(n^2)$
5	$n\mathrm{O}(n) = \mathrm{O}(n^2)$
6	$n\mathrm{O}(n) = \mathrm{O}(n^2)$
7	$\mathrm{O}(n)$
total	$\mathrm{O}(3n^2 + 4n) = \mathrm{O}(n^2)$

Justificativa

Bloco de linhas 4–6 é executado $\leq n$ vezes;
cada execução consome $\mathrm{O}(n)$;
todas juntas consomem $n\mathrm{O}(n)$.

Justificativa

Bloco de linhas 4–6 é executado $\leq n$ vezes;
cada execução consome $\mathrm{O}(n)$;
todas juntas consomem $n\mathrm{O}(n)$.

Êpa!

Quem garante que $n\mathrm{O}(n) = \mathrm{O}(n^2)$?
Quem garante que $\mathrm{O}(n^2) + \mathrm{O}(n^2) + \mathrm{O}(n^2) = \mathrm{O}(3n^2)$?
Quem garante que $\mathrm{O}(3n^2 + 4n) = \mathrm{O}(n^2)$?
Veja exercícios de Mais notação O.

$n\mathrm{O}(n) = \mathrm{O}(n^2)$

"$n\mathrm{O}(n) = \mathrm{O}(n^2)$" significa "$n\mathrm{O}(n) \subseteq \mathrm{O}(n^2)$".

Ou seja, se $T(n)$ é $\mathrm{O}(n)$, então $n\,T(n)$ é $\mathrm{O}(n^2)$.

$n\mathrm{O}(n) = \mathrm{O}(n^2)$

"$n\mathrm{O}(n) = \mathrm{O}(n^2)$" significa "$n\mathrm{O}(n) \subseteq \mathrm{O}(n^2)$".
Ou seja, se $T(n)$ é $\mathrm{O}(n)$, então $n\,T(n)$ é $\mathrm{O}(n^2)$.

De fato, se $T(n)$ é $\mathrm{O}(n)$ então existem constantes, digamos 10 e 10^{100}, tais que

$$T(n) \;\leq\; 10\,n$$

para todo $n \geq 10^{100}$. Desta forma,

$$n\,T(n) \;\leq\; n\,10\,n \leq 10\,n^2$$

para todo $n \geq 10^{100}$. Logo $n\,T(n)$ é $\mathrm{O}(n^2)$.

$n\mathrm{O}(n) = \mathrm{O}(n^2)$

"$n\mathrm{O}(n) = \mathrm{O}(n^2)$" significa "$n\mathrm{O}(n) \subseteq \mathrm{O}(n^2)$".
Ou seja, se $T(n)$ é $\mathrm{O}(n)$, então $n\,T(n)$ é $\mathrm{O}(n^2)$.

De fato, se $T(n)$ é $\mathrm{O}(n)$ então existem constantes positivas c e n_0, tais que

$$T(n) \;\leq\; c\,n$$

para todo $n \geq n_0$. Desta forma,

$$n\,T(n) \;\leq\; n\,c\,n \leq c\,n^2$$

para todo $n \geq n_0$. Logo $n\,T(n)$ é $\mathrm{O}(n^2)$.

Conclusão

O algoritmo ORDENA-POR-INSERÇÃO consome $\mathrm{O}(n^2)$ unidades de tempo.

Notação O cai como uma luva!

Exercício

Exercício 3.A

Problema: rearranjar um vetor $A[p\,..\,r]$ em ordem crescente. Escreva um algoritmo "de seleção" para o problema. Analise a correção do algoritmo (ou seja, encontre e prove as invariantes apropriadas). Analise o consumo de tempo do algoritmo; use notação O.

Mais notação assintótica

CLRS 4.1
AU 4.5, p.101–108

Exercícios

Exercício 4.A
Interprete e prove a afirmação $\mathrm{O}(n^2) + \mathrm{O}(n^2) + \mathrm{O}(n^2) = \mathrm{O}(3n^2)$.

Exercício 4.B
Interprete e prove a afirmação $n\mathrm{O}(n) = \mathrm{O}(n^2)$.

Exercício 4.C
Interprete e prove a afirmação $\mathrm{O}(3n^2 + 4n) = \mathrm{O}(n^2)$.

Exercício 4.D (propriedade transitiva)
Suponha $T(n) = \mathrm{O}(f(n))$ e $f(n) = \mathrm{O}(g(n))$.
Mostre que $T(n) = \mathrm{O}(g(n))$.
Dê um exemplo interessante.

Exercício 4.E (regra da soma, caso especial)
Suponha que $T(n) = \mathrm{O}(f(n))$ e mostre que $T(n) + f(n) = \mathrm{O}(f(n))$.
Dê um exemplo interessante.

Exercício 4.E' (regra da soma, geral)
Suponha $T_1(n) = \mathrm{O}(f_1(n))$ e $T_2(n) = \mathrm{O}(f_2(n))$. Se $f_1(n) = \mathrm{O}(f_2(n))$, mostre que $T_1(n) + T_2(n) = \mathrm{O}(f_2(n))$.

Mais exercícios

Exercício 4.F

O que significa "$T(n) = n^2 + \mathrm{O}(n)$"?
Mostre que se $T(n) = n^2 + \mathrm{O}(n)$ então $T(n) = \mathrm{O}(n^2)$.

Exercício 4.G

O que significa "$T(n) = n\mathrm{O}(\lg n)$"? Mostre que $T(n) = n\mathrm{O}(\lg n)$ se e só se $T(n) = \mathrm{O}(n \lg n)$.

Exercício 4.H

Interprete e prove a afirmação $7 \cdot \mathrm{O}(n) = \mathrm{O}(n)$.

Exercício 4.I

Interprete e prove a afirmação $\mathrm{O}(n) + \mathrm{O}(n) = \mathrm{O}(n)$.

Exercício 4.J

Prove que $\mathrm{O}(n) = \mathrm{O}(n^2)$. É verdade que $\mathrm{O}(n^2) = \mathrm{O}(n)$?

Exercício 4.K

Interprete e prove a afirmação $(n + 2) \cdot \mathrm{O}(1) = \mathrm{O}(n)$.

Mais exercícios ainda

Exercício 4.L

Interprete e prove a afirmação $\underbrace{\mathrm{O}(1) + \cdots + \mathrm{O}(1)}_{n+2} = \mathrm{O}(n)$.

Exercício 4.M

Prove que $\mathrm{O}(1) + \mathrm{O}(1) + \mathrm{O}(1) = \mathrm{O}(1)$.

É verdade que $\mathrm{O}(1) = \mathrm{O}(1) + \mathrm{O}(1) + \mathrm{O}(1)$?

Exercício 4.N

Interprete e prove a afirmação $\mathrm{O}(f) + \mathrm{O}(g) = \mathrm{O}(f + g)$.

Mais análise com notação O

CLRS 2.1–2.2

AU 3.3, 3.6 (muito bom)

Análise da intercalação

Problema: Dados $A[p\,..\,q]$ e $A[q{+}1\,..\,r]$ crescentes, rearranjar $A[p\,..\,r]$ de modo que ele fique em ordem crescente.

Para que valores de q o problema faz sentido?

Entra:



Análise da intercalação

Problema: Dados $A[p\,..\,q]$ e $A[q{+}1\,..\,r]$ crescentes, rearranjar $A[p\,..\,r]$ de modo que ele fique em ordem crescente.

Para que valores de q o problema faz sentido?

Entra:



Sai:



Intercalação



Intercalação



Intercalação



Intercalação



Intercalação



Intercalação



Intercalação



Intercalação



Intercalação



Intercalação



Intercalação



Intercalação

```
INTERCALA (A, p, q, r)
 0    ▷ B[p..r] é um vetor auxiliar
 1    para i ← p até q faça
 2         B[i] ← A[i]
 3    para j ← q + 1 até r faça
 4         B[r + q + 1 − j] ← A[j]
 5    i ← p
 6    j ← r
 7    para k ← p até r faça
 8         se B[i] ≤ B[j]
 9              então A[k] ← B[i]
10                   i ← i + 1
11              senão A[k] ← B[j]
12                   j ← j − 1
```

Consumo de tempo

Se a execução de cada linha de código consome 1 unidade de tempo o consumo total é:

linha	todas as execuções da linha
1	?
2	?
3	?
4	?
5	?
6	?
7	?
8	?
9–12	?
total	?

Consumo de tempo

Se a execução de cada linha de código consome 1 unidade de tempo o consumo total é ($n := r - p + 1$):

linha		todas as execuções da linha
1	$=$	$q - p + 2 \;=\; n - r + q + 1$
2	$=$	$q - p + 1 \;=\; n - r + q$
3	$=$	$r - (q + 1) + 2 \;=\; n - q + p$
4	$=$	$r - (q + 1) + 1 \;=\; n - q + p - 1$
5	$=$	1
6	$=$	1
7	$=$	$r - p + 2 \;=\; n + 1$
8	$=$	$r - p + 1 \;=\; n$
9–12	$=$	$2\,(r - p + 1) \;=\; 2n$
total	$=$	$8n - 2(r - p + 1) + 5 = \; 6n + 5$

Conclusão

O algoritmo INTERCALA consome $6n + 5$ unidades de tempo.

Consumo de tempo em O

Quanto tempo consome em função de $n := r - p + 1$?

linha	consumo de todas as execuções da linha
1–4	?
5–6	?
7	?
8	?
9–12	?
total	?

Consumo de tempo

Quanto tempo consome em função de $n := r - p + 1$?

linha	consumo de todas as execuções da linha
1–4	$\mathrm{O}(n)$
5–6	$\mathrm{O}(1)$
7	$n\mathrm{O}(1) = \mathrm{O}(n)$
8	$n\mathrm{O}(1) = \mathrm{O}(n)$
9–12	$n\mathrm{O}(1) = \mathrm{O}(n)$
total	$\mathrm{O}(4n + 1)$ = $\mathrm{O}(n)$

Conclusão

O algoritmo INTERCALA consome $\mathrm{O}(n)$ unidades de tempo.

Também escreve-se

O algoritmo INTERCALA consome tempo $\mathrm{O}(n)$.

Exercício

Exercício 5.A

Analise a correção e o consumo de tempo do seguinte algoritmo:

```
EXERC (A, p, r)
1   q ← ⌊(p + r)/2⌋
2   ORDENA-POR-INSERÇÃO (A, p, q)
3   ORDENA-POR-INSERÇÃO (A, q + 1, r)
4   INTERCALA (A, p, q, r)
```