Análise amortizada

CLRS 17

Análise amortizada

Serve para analisar uma sequência de operações ou iterações onde o pior caso individual não reflete o pior caso da sequência.

Em outras palavras, serve para melhorar análises de pior caso que baseiem-se diretamente no pior caso de uma operação/iteração e que deem uma delimitação frouxa para o tempo de pior caso da sequência.

Métodos:

- agregado
- por créditos
- potencial

Odômetro binário

Considere um contador binário, inicialmente zerado, representado em um vetor $A[0\,..\,n-1]$, onde cada $A[i]$ vale 0 ou 1.

Operação: incrementa.

```
INCREMENTA (A, n)
1   i ← 0
2   enquanto i < n e A[i] = 1 faça
3       A[i] ← 0
4       i ← i + 1
5   se i < n
6       então A[i] ← 1
```

Consumo de tempo no pior caso: $\Theta(n)$

Odômetro binário

Considere um contador binário, inicialmente zerado, representado em um vetor $A[0\,..\,n-1]$, onde cada $A[i]$ vale 0 ou 1.

Operação: INCREMENTA.

Consumo de tempo no pior caso: $\Theta(n)$.

O odômetro dá uma volta completa a cada 2^n execuções do INCREMENTA.

Quanto tempo leva para o odômetro dar uma volta completa?

Leva $\mathrm{O}(n2^n)$.

Será que é $\Theta(n2^n)$?

Odômetro binário

i	3	2	1	0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1
16	0	0	0	0

Odômetro binário

i	3	2	1	0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1
16	0	0	0	0

Método agregado

Custo da volta completa é proporcional
ao número de vezes que os bits são alterados.

bit 0 muda 2^n vezes
bit 1 muda 2^{n-1} vezes
bit 2 muda 2^{n-2} vezes
$\ldots$
bit $n-2$ muda 4 vezes
bit $n-1$ muda 2 vezes

Total de alterações de bits: $\sum_{i=1}^{n} 2^i < 2 \cdot 2^n$.

Custo da volta completa: $\Theta(2^n)$.

Custo amortizado por INCREMENTA: $\Theta(1)$.

Análise por créditos

Atribuímos um número fixo de créditos por operação INCREMENTA de modo a pagar por toda alteração de bit.

Objetivo: atribuir o menor número possível de créditos que seja ainda suficiente para pagar por todas as alterações.

Relembre...

```
INCREMENTA (A, n)
1   i ← 0
2   enquanto i < n e A[i] = 1 faça
3       A[i] ← 0
5       i ← i + 1
6   se i < n
7       então A[i] ← 1
```

Análise por créditos

Atribuímos 2 créditos por INCREMENTA.

```
INCREMENTA (A, n)
1   i ← 0
2   enquanto i < n e A[i] = 1 faça
3       A[i] ← 0
4       i ← i + 1
5   se i < n
6       então A[i] ← 1
```

Um é usado para pagar pela alteração da linha 6.

O outro fica armazenado sobre o bit alterado na linha 6.

Há um crédito armazenado sobre cada bit que vale 1.

Alterações da linha 3 são pagas por créditos armazenados por chamadas anteriores do INCREMENTA.

Análise por créditos

Atribuímos 2 créditos por INCREMENTA.

INCREMENTA (A, n)

1 $i \leftarrow 0$
2 **enquanto** $i < n$ **e** $A[i] = 1$ **faça**
3 $\quad A[i] \leftarrow 0$
4 $\quad i \leftarrow i + 1$
5 **se** $i < n$
6 $\quad$ **então** $A[i] \leftarrow 1$

Um é usado para pagar pela alteração da linha 6.

O outro fica armazenado sobre o bit alterado na linha 6.

O número de créditos armazenados em cada instante é o número de bits que valem 1, logo é sempre não negativo.

Custo amortizado por INCREMENTA: 2

Método do potencial

Seja $\phi(A)$ o número de bits que valem 1 em $A[0\,..\,n-1]$.

Seja A_i o estado do contador A após o i-ésimo INCREMENTA.

Note que $\phi(A_0) = 0$ e $\phi(A_i) \geq 0$.

Seja c_i o número de bits alterados no i-ésimo INCREMENTA.

Note que $c_i \leq 1 + t_i$ onde t_i é o número de bits 1 consecutivos no final do contador A.

Note que $\phi(A_i) - \phi(A_{i-1}) \leq 1 - t_i$.

Seja $\hat{c}_i = c_i + \phi(A_i) - \phi(A_{i-1}) \leq (1 + t_i) + (1 - t_i) = 2$.

Método do potencial

Seja $\phi(A)$ o número de bits que valem 1 em $A[0\,..\,n-1]$.

Seja A_i o estado do contador A após o i-ésimo INCREMENTA. Temos que $\phi(A_0) = 0$ e $\phi(A_i) \geq 0$.

Seja c_i o número de bits alterados no i-ésimo INCREMENTA e t_i é o número de bits 1 consecutivos no final do contador A. Temos que $c_i \leq 1 + t_i$.

Seja $\hat{c}_i = c_i + \phi(A_i) - \phi(A_{i-1}) \leq (1 + t_i) + (1 - t_i) = 2$.

Então o custo da volta completa é

$$c \;=\; \sum_{i=1}^{2^n} c_i \;=\; \sum_{i=1}^{2^n} \hat{c}_i + \phi(A_0) - \phi(A_{2^n}) \;\leq\; \sum_{i=1}^{2^n} \hat{c}_i \;\leq\; 2 \cdot 2^n.$$

Custo amortizado por INCREMENTA: 2 $\quad\triangleright$ (valor do $\hat{c}_i$)

Tabelas dinâmicas

Vetor que sofre inserções. Cada inserção custa 1.

Inicialmente o vetor tem 0 posições.

Na primeira inserção, um vetor com uma posição é alocado, e o item em questão é inserido.

A cada inserção em que o vetor está cheio, antes da inserção propriamente dita, um vetor do dobro do tamanho é alocado, o vetor anterior é copiado para o novo vetor e depois é desalocado.

O custo no pior caso de uma inserção é alto, pois pode haver uma realocação.

Tabelas dinâmicas

Para $i = 0, 1, 2, \ldots, n-1$,

$$c_i = \begin{cases} 1 & \text{se } i \text{ não é potência de 2} \\ i+1 & \text{se } i \text{ é potência de 2} \end{cases}$$

Método agregado:

$$\sum_{i=0}^{n-1} c_i = n + (1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^k)$$

onde $k = \lfloor \lg n \rfloor$.

Logo $\sum_{i=0}^{n-1} c_i = n + 2^{k+1} - 1 \leq n + 2n - 1 < 3n$.

Custo amortizado por inserção: 3

Análise por créditos

Chame de velho um item que já estava no vetor no momento da última realocação do vetor, e de novos os itens inseridos após a última realocação.

Atribuímos 3 créditos por inserção:
um é usado para pagar pela inserção do item,
os outros dois são armazenados sobre o item.

Ao ocorrer uma realocação, há 2 créditos sobre cada item novo no vetor, e isso é suficiente para pagar pela cópia de todos os itens do vetor para o novo vetor pois, quando o vetor está cheio, há um item novo para cada item velho.

Em outras palavras, o segundo crédito paga a cópia do item na primeira realocação que acontecer após a sua inserção, e o terceiro crédito paga a cópia de um item velho nesta mesma realocação.

Método do potencial

T_i: tabela antes da inserção i

n_i: número de itens na tabela T_i s_i: tamanho da tabela T_i.

Método do potencial

T_i: tabela antes da inserção i

n_i: número de itens na tabela T_i s_i: tamanho da tabela T_i.

Seja $\phi(T_i) = 2n_i - s_i$.

Método do potencial

T_i: tabela antes da inserção i

n_i: número de itens na tabela T_i s_i: tamanho da tabela T_i.

Seja $\phi(T_i) = 2n_i - s_i$.

Como T_0 é vazia, $n_0 = s_0 = 0$, e portanto $\phi(T_0) = 0$.

Método do potencial

T_i: tabela antes da inserção i

n_i: número de itens na tabela T_i s_i: tamanho da tabela T_i.

Seja $\phi(T_i) = 2n_i - s_i$.

Como T_0 é vazia, $n_0 = s_0 = 0$, e portanto $\phi(T_0) = 0$.

Como não há remoção, $n_i \geq s_i/2$. Logo $\phi(T_i) \geq 0$.

Método do potencial

T_i: tabela antes da inserção i

n_i: número de itens na tabela T_i s_i: tamanho da tabela T_i.

Seja $\phi(T_i) = 2n_i - s_i$.

Como T_0 é vazia, $n_0 = s_0 = 0$, e portanto $\phi(T_0) = 0$.

Como não há remoção, $n_i \geq s_i/2$. Logo $\phi(T_i) \geq 0$.

Lembre-se que $c_i = \begin{cases} 1 & \text{se } i-1 \text{ não é potência de 2} \\ i & \text{se } i-1 \text{ é potência de 2} \end{cases}$

Método do potencial

T_i: tabela antes da inserção i

n_i: número de itens na tabela T_i s_i: tamanho da tabela T_i.

Seja $\phi(T_i) = 2n_i - s_i$.

Como T_0 é vazia, $n_0 = s_0 = 0$, e portanto $\phi(T_0) = 0$.

Como não há remoção, $n_i \geq s_i/2$. Logo $\phi(T_i) \geq 0$.

Lembre-se que $c_i = \begin{cases} 1 & \text{se } i-1 \text{ não é potência de 2} \\ i & \text{se } i-1 \text{ é potência de 2} \end{cases}$

Custo amortizado: $\hat{c}_i = c_i + \phi(T_i) - \phi(T_{i-1})$

Método do potencial

T_i: tabela antes da inserção i

n_i: número de itens na tabela T_i $\quad$ s_i: tamanho da tabela T_i.

Seja $\phi(T_i) = 2n_i - s_i$.

Como T_0 é vazia, $n_0 = s_0 = 0$, e portanto $\phi(T_0) = 0$.

Como não há remoção, $n_i \geq s_i/2$. Logo $\phi(T_i) \geq 0$.

Lembre-se que $c_i = \begin{cases} 1 & \text{se } i-1 \text{ não é potência de 2} \\ i & \text{se } i-1 \text{ é potência de 2} \end{cases}$

Custo amortizado: $\hat{c}_i = c_i + \phi(T_i) - \phi(T_{i-1})$

Note que $n_i = n_{i-1} + 1$.

Método do potencial

T_i: tabela antes da inserção i

n_i: número de itens na tabela T_i $\quad$ s_i: tamanho da tabela T_i.

Seja $\phi(T_i) = 2n_i - s_i$.

Como T_0 é vazia, $n_0 = s_0 = 0$, e portanto $\phi(T_0) = 0$.

Como não há remoção, $n_i \geq s_i/2$. Logo $\phi(T_i) \geq 0$.

Lembre-se que $c_i = \begin{cases} 1 & \text{se } i-1 \text{ não é potência de 2} \\ i & \text{se } i-1 \text{ é potência de 2} \end{cases}$

Custo amortizado: $\hat{c}_i = c_i + \phi(T_i) - \phi(T_{i-1})$

Note que $n_i = n_{i-1} + 1$.

Se $i-1$ não é potência de 2, então $c_i = 1$ e $s_i = s_{i-1}$.

Método do potencial

T_i: tabela antes da inserção i

n_i: número de itens na tabela T_i s_i: tamanho da tabela T_i.

Seja $\phi(T_i) = 2n_i - s_i$.

Como T_0 é vazia, $n_0 = s_0 = 0$, e portanto $\phi(T_0) = 0$.

Como não há remoção, $n_i \geq s_i/2$. Logo $\phi(T_i) \geq 0$.

Lembre-se que $c_i = \begin{cases} 1 & \text{se } i-1 \text{ não é potência de 2} \\ i & \text{se } i-1 \text{ é potência de 2} \end{cases}$

Custo amortizado: $\hat{c}_i = c_i + \phi(T_i) - \phi(T_{i-1})$

Note que $n_i = n_{i-1} + 1$.

Se $i-1$ não é potência de 2, então $c_i = 1$ e $s_i = s_{i-1}$.
Assim $\hat{c}_i = 1 + (2n_i - s_i) - (2n_{i-1} - s_{i-1}) = 1 + 2 = 3$.

Método do potencial

T_i: tabela antes da inserção i
n_i: número de itens na tabela T_i s_i: tamanho da tabela T_i.
$\phi(T_i) = 2n_i - s_i$.

Lembre-se que $c_i = \begin{cases} 1 & \text{se } i-1 \text{ não é potência de 2} \\ i & \text{se } i-1 \text{ é potência de 2} \end{cases}$

Custo amortizado: $\hat{c}_i = c_i + \phi(T_i) - \phi(T_{i-1})$
Lembre-se que $n_i = n_{i-1} + 1$.

Se $i-1$ é potência de 2, então ...

Método do potencial

T_i: tabela antes da inserção i
n_i: número de itens na tabela T_i $\quad$ s_i: tamanho da tabela T_i.
$\phi(T_i) = 2n_i - s_i$.

Lembre-se que $c_i = \begin{cases} 1 & \text{se } i-1 \text{ não é potência de 2} \\ i & \text{se } i-1 \text{ é potência de 2} \end{cases}$

Custo amortizado: $\hat{c}_i = c_i + \phi(T_i) - \phi(T_{i-1})$
Lembre-se que $n_i = n_{i-1} + 1$.

Se $i-1$ é potência de 2, então ...
$c_i = i$, $\quad s_i = 2s_{i-1}$ $\quad$ e $\quad s_{i-1} = n_{i-1} = i - 1$.

Método do potencial

T_i: tabela antes da inserção i
n_i: número de itens na tabela T_i s_i: tamanho da tabela T_i.
$\phi(T_i) = 2n_i - s_i$.

Lembre-se que $c_i = \begin{cases} 1 & \text{se } i-1 \text{ não é potência de 2} \\ i & \text{se } i-1 \text{ é potência de 2} \end{cases}$

Custo amortizado: $\hat{c}_i = c_i + \phi(T_i) - \phi(T_{i-1})$
Lembre-se que $n_i = n_{i-1} + 1$.

Se $i-1$ é potência de 2, então ...
$c_i = i$, $s_i = 2s_{i-1}$ e $s_{i-1} = n_{i-1} = i - 1$.

Assim
$$\hat{c}_i = i + (2n_i - s_i) - (2n_{i-1} - s_{i-1})$$

Método do potencial

T_i: tabela antes da inserção i
n_i: número de itens na tabela T_i s_i: tamanho da tabela T_i.
$\phi(T_i) = 2n_i - s_i$.

Lembre-se que $c_i = \begin{cases} 1 & \text{se } i-1 \text{ não é potência de 2} \\ i & \text{se } i-1 \text{ é potência de 2} \end{cases}$

Custo amortizado: $\hat{c}_i = c_i + \phi(T_i) - \phi(T_{i-1})$
Lembre-se que $n_i = n_{i-1} + 1$.

Se $i-1$ é potência de 2, então ...
$c_i = i$, $s_i = 2s_{i-1}$ e $s_{i-1} = n_{i-1} = i - 1$.

Assim

$$\begin{aligned} \hat{c}_i &= i + (2n_i - s_i) - (2n_{i-1} - s_{i-1}) \\ &= i + (2(n_{i-1} + 1) - 2s_{i-1}) - n_{i-1} \end{aligned}$$

Método do potencial

T_i: tabela antes da inserção i
n_i: número de itens na tabela T_i s_i: tamanho da tabela T_i.
$\phi(T_i) = 2n_i - s_i$.

Lembre-se que $c_i = \begin{cases} 1 & \text{se } i-1 \text{ não é potência de 2} \\ i & \text{se } i-1 \text{ é potência de 2} \end{cases}$

Custo amortizado: $\hat{c}_i = c_i + \phi(T_i) - \phi(T_{i-1})$
Lembre-se que $n_i = n_{i-1} + 1$.

Se $i-1$ é potência de 2, então ...
$c_i = i$, $s_i = 2s_{i-1}$ e $s_{i-1} = n_{i-1} = i - 1$.

Assim

$$\begin{aligned} \hat{c}_i &= i + (2n_i - s_i) - (2n_{i-1} - s_{i-1}) \\ &= i + (2(n_{i-1} + 1) - 2s_{i-1}) - n_{i-1} \\ &= i + (2 + n_{i-1} - 2s_{i-1}) \end{aligned}$$

Método do potencial

T_i: tabela antes da inserção i
n_i: número de itens na tabela T_i $\quad$ s_i: tamanho da tabela T_i.
$\phi(T_i) = 2n_i - s_i$.

Lembre-se que $c_i = \begin{cases} 1 & \text{se } i-1 \text{ não é potência de 2} \\ i & \text{se } i-1 \text{ é potência de 2} \end{cases}$

Custo amortizado: $\hat{c}_i = c_i + \phi(T_i) - \phi(T_{i-1})$
Lembre-se que $n_i = n_{i-1} + 1$.

Se $i-1$ é potência de 2, então ...
$c_i = i, \quad s_i = 2s_{i-1}$ e $s_{i-1} = n_{i-1} = i-1$.

Assim

$$\begin{aligned} \hat{c}_i &= i + (2n_i - s_i) - (2n_{i-1} - s_{i-1}) \\ &= i + (2(n_{i-1}+1) - 2s_{i-1}) - n_{i-1} \\ &= i + (2 + n_{i-1} - 2s_{i-1}) \\ &= i + (2 - (i-1)) \;=\; 3. \end{aligned}$$