Medida e Integração - IME - 2020

Gláucio Terra

glaucio@ime.usp.br

<https://www.ime.usp.br/~glaucio/mat5798>

Departamento de Matemática
IME - USP

8 de junho de 2020

Medidas com Sinal

Notação

Fixemos um espaço mensurável $(X, \mathcal{M})$ até o final desta seção.

Definição (medida com sinal)

Uma *medida com sinal* ou *carga* em $(X, \mathcal{M})$ é uma aplicação $\nu : \mathcal{M} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ tal que:

- ms.i) $\text{Im } \nu \subset (-\infty, \infty]$ ou $\text{Im } \nu \subset [-\infty, \infty)$.
- ms.ii) $\nu(\emptyset) = 0$.
- ms.iii) Se $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \prec \mathcal{M}$, $\nu(\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(A_n)$, com o significado de que, no segundo membro, a integral com respeito à medida de contagem existe e é igual ao primeiro membro (ou, equivalentemente, uma das séries $\sum_{n=1}^{\infty} \nu(A_n)^+$, $\sum_{n=1}^{\infty} \nu(A_n)^-$ tem soma finita e $\nu(\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(A_n)^+ - \sum_{n=1}^{\infty} \nu(A_n)^-$).

Observação

Por uma questão de clareza, doravante usaremos “medida positiva” para designar uma medida $\mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$.

Exemplo

1. Se $\mu^+, \mu^- : \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$ forem medidas positivas, sendo ao menos uma delas finita, $\nu \doteq \mu^+ - \mu^-$ é uma medida com sinal em $(X, \mathcal{M})$.
2. Se μ for uma medida positiva em $\mathcal{M}$ e $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ for μ -quase integrável, $\nu : \mathcal{M} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ dada por $E \mapsto \int f \, d\mu$ é uma medida com sinal em $(X, \mathcal{M})$.

Observação

Veremos, mais adiante, que toda medida com sinal em $(X, \mathcal{M})$ pode ser escrita em qualquer uma das formas do exemplo acima.

Proposição (continuidade para cima e para baixo)

Seja ν medida com sinal em $(X, \mathcal{M})$.

- i) (continuidade para cima) Se $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \prec \mathcal{M}$ crescente,
 $\nu(\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \lim \nu(A_n)$.
- ii) (continuidade para baixo) Se $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \prec \mathcal{M}$ decrescente e
 $\nu(A_1)$ finito, $\nu(\cap_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \lim \nu(A_n)$.

Demonstração.

É o mesmo argumento usado na prova do enunciado correspondente para medidas positivas:

- i) Tome $(\forall n \in \mathbb{N}) \tilde{A}_n \doteq A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k$. Então $(\tilde{A}_n)_{n \in \mathbb{N}} \prec \mathcal{M}$ e $\dot{\bigcup}_{n \in \mathbb{N}} \tilde{A}_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, de modo que, por (ms.iii), $\nu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \nu(\tilde{A}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \nu(\tilde{A}_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu(A_n)$, pois $(\forall n) A_n = \dot{\bigcup}_{k=1}^n \tilde{A}_k$.
- ii) Aplique a parte i) à sequência crescente $(A_1 \setminus A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ para concluir que $\nu(A_1 \setminus \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \lim \nu(A_1 \setminus A_n)$. Como $\nu(A_1)$ é finito, $\nu(A_1 \setminus \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \nu(A_1) - \nu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n)$ e $\lim \nu(A_1 \setminus A_n) = \nu(A_1) - \lim \nu(A_n)$, donde a tese.

Definição (conjuntos positivos, negativos e nulos)

Seja ν uma medida com sinal em $(X, \mathcal{M})$ e $A \in \mathcal{M}$. Diz-se que A é:

- i) *positivo* com respeito a ν se $\forall B \in \mathcal{M}$ tal que $B \subset A$, $\nu(B) \geq 0$.
- ii) *negativo* com respeito a ν se $\forall B \in \mathcal{M}$ tal que $B \subset A$, $\nu(B) \leq 0$.
- iii) *nulo* com respeito a ν se for positivo e negativo, i.e. se $\forall B \in \mathcal{M}$ tal que $B \subset A$, $\nu(B) = 0$.

Proposição

Seja ν uma medida com sinal em $(X, \mathcal{M})$.

1. Se $A \in \mathcal{M}$ for positivo (respectivamente, negativo), todo subconjunto mensurável de A é positivo (resp., negativo).
2. Se $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \prec \mathcal{M}$ for uma sequência de positivos (resp., negativos), $(\cup_{n \in \mathbb{N}})A_n$ é positivo (resp., negativo).

Demonstração.

A parte 1. é imediata. Provemos a parte 2., supondo

$(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \prec \mathcal{M}$ sequência de positivos. Tome

$(\forall n \in \mathbb{N}) \tilde{A}_n \doteq A_n \setminus \cup_{k=1}^{n-1} A_k$. Então $(\tilde{A}_n)_{n \in \mathbb{N}} \prec \mathcal{M}$ e, para todo

$B \subset \cup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ mensurável, $\nu(B) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \nu(B \cap \tilde{A}_n) \geq 0$, pois

$(\forall n) B \cap \tilde{A}_n \subset A_n$ é positivo. □

Teorema (teorema de decomposição de Hahn)

Seja ν uma medida com sinal em $(X, \mathcal{M})$. Então existem $P, N \in \mathcal{M}$, P positivo e N negativo com respeito a ν , tais que $P \cup N = X$ e $P \cap N = \emptyset$. Além disso, esta decomposição é única no seguinte sentido: se P', N' forem outros mensuráveis com a mesmas propriedades, então $P \Delta P'$ e $N \Delta N'$ são nulos com respeito a ν .

Definição

Com a notação do teorema acima, o par (P, N) chama-se uma *decomposição de Hahn* para ν .

Ideia:

SPG, suponha $\infty \notin \text{Im } \nu$ (caso contrário faça o argumento com $-\nu$). Suponha que exista uma tal decomposição. Para todo $\tilde{P}$ positivo, $\nu(\tilde{P}) = \nu(\tilde{P} \cap P) + \nu(\tilde{P} \cap N) = \nu(\tilde{P} \cap P) \leq \nu(P)$. Isso nos motiva a procurar P em $\{A \subset X \mid A \text{ positivo}\}$ com medida máxima.

Observação

- O teorema de decomposição de Hahn fornece uma decomposição do “espaço”;
- obteremos, a seguir, a partir da decomposição de Hahn, uma decomposição para a medida com sinal ν : a *decomposição de Jordan*.

Definição (medidas mutuamente singulares)

Sejam ν, λ medidas com sinal em $(X, \mathcal{M})$.

- Diz-se que ν é *concentrada* em $N \in \mathcal{M}$ se N^c for nulo para ν , i.e. se $(\forall A \in \mathcal{M}) \nu(A) = \nu(A \cap N)$.
- Diz-se que ν e λ são *mutuamente singulares* (NOTAÇÃO: $\nu \perp \lambda$) se existirem $N, L \in \mathcal{M}$ tais que $N \cup L = X$, $N \cap L = \emptyset$, ν concentrada em N e λ concentrada em L .

Teorema (teorema de decomposição de Jordan)

Seja ν uma medida com sinal em $(X, \mathcal{M})$. Então existem únicas medidas positivas ν^+, ν^- tais que $\nu = \nu^+ - \nu^-$ e $\nu^+ \perp \nu^-$.

Demonstração.

- 1) existência: tome (P, N) decomposição de Hahn para ν ,
 $\nu^+ \doteq \nu \llcorner P : E \in \mathcal{M} \mapsto \nu(E \cap P)$ e $\nu^- \doteq -\nu \llcorner N$.
- 2) unicidade: suponha μ^+, μ^- medidas positivas tais que
 $\nu = \mu^+ - \mu^-$ e $\mu^+ \perp \mu^-$. Tome $P', N' \in \mathcal{M}$ disjuntos e tais
que $X = P' \cup N'$, P' nulo para μ^- e N' nulo para μ^+ .
Sejam $\nu^\pm$ e (P, N) como no item anterior. Então (P, N) e
 (P', N') são ambas decomposições de Hahn para ν , de
modo que, pela unicidade enunciada no teorema de
decomposição de Hahn, $P \Delta P'$ e $N \Delta N'$ são ν -nulos.
Então, para todo $E \in \mathcal{M}$, tem-se:

$$\mu^+(E) = \mu^+(E \cap P') = \nu(E \cap P') = \nu(E \cap P) = \nu^+(E).$$

Analogamente, $\mu^-(E) = \nu^-(E)$, logo $\mu^+ = \nu^+$ e $\mu^- = \nu^-$.

Definição (variações positiva, negativa e total de uma medida com sinal)

Com a notação do teorema acima, o par (ν^+, ν^-) chama-se *decomposição de Jordan* para ν .

- A medida positiva ν^+ chama-se *variação positiva* e a medida ν^- chama-se *variação negativa* de ν .
- A medida positiva $|\nu| \doteq \nu^+ + \nu^-$ chama-se ν^+ *variação total* de ν .

Observação

1. A nomenclatura acima segue a mesma nomenclatura usada para a decomposição de uma função de variação limitada nas suas variações positiva, negativa e total, conforme será visto mais adiante; e, conforme também será visto, estas decomposições para medidas e para funções estão relacionadas entre si.
2. Note que, se $\infty \notin \text{Im } \nu$, $\nu^+(X) = \nu(P) < \infty$, de modo que ν^+ é uma medida finita. Analogamente, se $-\infty \notin \text{Im } \nu$, ν^- é uma medida finita. Em particular, se $\text{Im } \nu \subset \mathbb{R}$, então $\text{Im } \nu$ é um subconjunto limitado de $\mathbb{R}$.

Integral com respeito a uma medida com sinal

Definição

Seja ν medida com sinal em $(X, \mathcal{M})$.

i) $L^1(\nu) \doteq L^1(\nu^+) \cap L^1(\nu^-)$. Para $f \in L^1(\nu)$,
$$\int f \, d\nu \doteq \int f \, d\nu^+ - \int f \, d\nu^-.$$

ii) ν diz-se σ -finita se ν^+ e ν^- o forem (see $|\nu|$ o for).

Exercício

Seja ν medida com sinal em $(X, \mathcal{M})$. Então:

a) $\forall E \in \mathcal{M}, |\nu(E)| \leq |\nu|(E)$.

b) $L^1(\nu) = L^1(|\nu|)$ e, para toda $f \in L^1(\nu)$, $|\int f \, d\nu| \leq \int |f| \, d|\nu|$.

c) $\nu = f \, d|\nu|$, onde $f = \chi_P - \chi_N$ e (P, N) decomposição de Hahn para ν .