MAT0103 - Prova de nivelamento (04/04/2025)

Nome: Soluções

Número USP:

Assinatura:

Respostas					
Questão	A	B	C	D	E
1	☒	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☒	☐
3	☐	☐	☐	☐	☒
4	☐	☒	☐	☐	☐
5	☒	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☒	☐
7	Anulada				
8	Anulada				
9	☐	☐	☐	☐	☒
10	☐	☐	☒	☐	☐
11	☐	☐	☐	☐	☒
12	☐	☒	☐	☐	☐

1) Assinale a alternativa que contém uma expressão algébrica equivalente a

$$\frac{4x^2 - 4x - 3}{4x^2 - 9}$$

quando $x \neq \frac{3}{2}$.

(a) $\frac{2x + 1}{2x + 3}$

(b) $\frac{2x + 3}{2x + 1}$

(c) $\frac{2x - 1}{2x + 3}$

(d) $\frac{2x - 3}{2x + 1}$

(e) $\frac{2x - 1}{2x - 3}$

Solução: Alternativa (A)

Para simplificar esta expressão algébrica, vamos inicialmente analisar se é possível fatorar o denominador e o numerador. Observe que o denominador $4x^2 - 9$ corresponde a uma diferença de quadrados, já que $(2x)^2 - 3^2 = 4x^2 - 9$. Assim, podemos utilizar o seguinte produto notável:

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \quad (1)$$

No caso, substituindo $a = 2x$ e $b = 3$, chegamos a

$$(2x)^2 - 3^2 = (2x + 3)(2x - 3)$$

Como $x \neq \frac{3}{2}$ pela hipótese do enunciado, nenhum dos fatores acima é nulo. Agora, vejamos se é possível fatorar o numerador da fração utilizando um dos fatores encontrados no denominador. Observe que

$$4x^2 - 4x - 3 = (2x + 1)(2x - 3).$$

Assim, lembrando que $2x - 3 \neq 0$, temos que

$$\begin{aligned} \frac{4x^2 - 4x - 3}{4x^2 - 9} &= \frac{(2x + 1)\cancel{(2x - 3)}}{(2x + 3)\cancel{(2x - 3)}} \\ &= \frac{2x + 1}{2x + 3} \end{aligned}$$

Esta simplificação corresponde à que está indicada na Alternativa (A).

2) Assinale a alternativa que indica uma expressão equivalente a

$$(a^2 + b^2)^2 - (a^2 - b^2)^2.$$

(a) $4ab$

(b) $2a^2b^2$

(c) $[(a + b)^2 - (a^2 - b^2)]^2$

(d) $[(a + b)^2 - (a^2 + b^2)]^2$

(e) $[(a + b)^2 + (a^2 + b^2)]^2$

Solução: Alternativa (D)

Para resolver esta questão, vamos utilizar dois produtos notáveis:

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y) \quad (2)$$

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 \quad (3)$$

Fazendo uso da diferença de quadrados 2, temos

$$\begin{aligned} (a^2 + b^2)^2 - (a^2 - b^2)^2 &= \left((a^2 + b^2) + (a^2 - b^2) \right) \left((a^2 + b^2) - (a^2 - b^2) \right) \\ &= \left(a^2 + b^2 + a^2 - b^2 \right) \left(a^2 + b^2 - a^2 + b^2 \right) \\ &= 2a^2 \cdot 2b^2 \\ &= 4a^2b^2 \end{aligned}$$

Agora, observe que $4a^2b^2 = (2ab)^2$. Utilizando o produto notável quadrado da soma 3, obtemos

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Para que reste apenas $2ab$ na equação acima, basta subtrair $a^2 + b^2$. Assim,

$$(a + b)^2 - (a^2 + b^2) = 2ab.$$

Dessa forma, concluímos que

$$\left((a + b)^2 - (a^2 + b^2) \right)^2 = (2ab)^2 = 4a^2b^2.$$

Portanto,

$$(a^2 + b^2)^2 - (a^2 - b^2)^2 = \left((a + b)^2 - (a^2 + b^2) \right)^2.$$

Segue que a resposta correta é a Alternativa (D).

3) Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida pelo gráfico abaixo:

A lei de formação da função f é dada por

$$(a) f(x) = \begin{cases} x + 2, & \text{se } x < 0 \\ 2, & \text{se } 0 \leq x < 4 \\ x^2 - x, & \text{se } x \geq 4 \end{cases}$$

$$(b) f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x < 0 \\ 1, & \text{se } 0 < x < 4 \\ 2 - x, & \text{se } x \geq 4 \end{cases}$$

$$(c) f(x) = \begin{cases} x + 2, & \text{se } x < 0 \\ 1, & \text{se } 0 \leq x < 4 \\ x - 2, & \text{se } x \geq 4 \end{cases}$$

$$(d) f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \leq 1 \\ x, & \text{se } 1 < x < 4 \\ -x, & \text{se } x \geq 4 \end{cases}$$

$$(e) f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \leq 1 \\ 1, & \text{se } 1 < x < 4 \\ 5 - x, & \text{se } x \geq 4 \end{cases}$$

Solução: Alternativa (E)

Vamos analisar o gráfico de f por partes. Primeiramente, observe que cada quadriculado corresponde a uma unidade. Isso significa que a figura apresenta o eixo das abscissas Ox de -2 até 6 e o eixo das ordenadas Oy de -2 até 2 .

- De $x = -2$ até $x = 1$, observe que $f(x) = x$.
- De $x = 1$ até $x = 4$, veja que o valor de f permanece constante, valendo sempre 1 . Logo, $f(x) = 1$ de $x = 1$ até $x = 4$.
- De $x = 4$ até $x = 6$, a função f passa a decrescer. Pela imagem, pode-se ver que $f(4) = 1$, $f(5) = 0$ e $f(6) = -1$. Assim, nesse intervalo inferimos que $f(x) = 5 - x$.

Após analisar cada um dos trechos, chegamos à conclusão de que

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \leq 1 \\ 1, & \text{se } 1 < x < 4 \\ 5 - x, & \text{se } x \geq 4 \end{cases},$$

o que corresponde a representação de f fornecida na Alternativa (E).

4) Considere a função $f(x) = \frac{1}{\sqrt{8 - |x - 7|}}$. Pode-se dizer que o domínio de f é

- (a) $(7, 8)$ (b) $(-1, 15)$ (c) $[-1, 15]$ (d) $[0, 14]$ (e) $\mathbb{R}$

Solução: Alternativa B

Para determinar o domínio de f , ou seja, o conjunto de pontos nos quais podemos calcular o valor de f sem enfrentar problemas (como divisão por 0 ou raízes quadradas negativas), inicialmente precisamos supor que estamos tratando do maior conjunto possível, no caso, o conjunto dos números reais $\mathbb{R}$, e estudar se existem valores de f no qual ela não está definida. Como f é composta por um quociente, então para que ela esteja bem-definida, o denominador deve ser não nulo. Desse modo, precisamos garantir que

$$\sqrt{8 - |x - 7|} \neq 0$$

Além disso, o radicando não pode ser um número negativo. Ou seja,

$$8 - |x - 7| > 0$$

Para isso, vamos encontrar os possíveis valores de x tais que essa identidade não se concretiza, ou seja, os valores de x que não podem estar no domínio de f . Veja que

$$\begin{aligned} 8 - |x - 7| \leq 0 &\Leftrightarrow -|x - 7| \leq -8 \\ &\Leftrightarrow |x - 7| \geq 8 \end{aligned}$$

Antes de prosseguir, precisamos lembrar da definição da função módulo, também chamada de valor absoluto. Se $x \geq 0$, então $|x| = x$. (por exemplo, $|8| = 8$ pois $8 > 0$). Mas se $x < 0$, o sinal de x será negativo, e a função módulo irá retirar este sinal (por exemplo, $|-7| = 7$, pois $-7 < 0$). Mas veja que $7 = -(-7)$. Logo, podemos ver que, se $x < 0$, então $|x| = -x$. Em resumo:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Desse modo, na equação $|x - 7| \geq 8$ temos dois casos a considerar:

- Se $x - 7 \geq 0$, então $|x - 7| = x - 7$. Nesse caso,

$$x - 7 \geq 8 \Rightarrow x \geq 15.$$

- Se $x - 7 < 0$, então $|x - 7| = -(x - 7) = 7 - x$. Nesse caso,

$$7 - x \geq 8 \Rightarrow -x \geq 1 \Rightarrow x \leq -1.$$

Concluimos portanto que a função não está definida se $x \geq 15$ ou se $x \leq -1$. Portanto, o domínio corresponde a $-1 < x < 15$, o que na notação de conjuntos corresponde ao intervalo $(-1, 15)$.

Para as próximas duas questões, considere a função $f: [-4, 5] \rightarrow \mathbb{R}$, cujo gráfico está mostrado na figura seguinte.

5) Qual dos conjuntos abaixo representa a imagem de f ?

- (a) $[-4, 3)$ (b) $[-4, 3]$ (c) $[-4, 5]$ (d) $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ (e) $\mathbb{R}$

Solução: Alternativa (A)

A imagem de f corresponde ao conjunto de valores que f pode assumir para os valores de x nos quais ela está definida. Vamos observar o eixo Oy das ordenadas para descobrir os valores que f assume. Para isso, é importante ter em conta que uma bolinha branca no gráfico $\circ$ indica um elemento que não está incluído no gráfico, enquanto uma bolinha preta significa que o valor ali descrito faz parte do intervalo. Por exemplo, veja que para $x = 0$, temos uma bolinha preta no 0 e uma bolinha branca no 3. Isso significa que $f(0) = 0$. Como para $x = 3$, há uma bolinha preta correspondente a $y = 4$, isso quer dizer que $f(3) = -4$, e portanto -4 é um elemento da imagem de f .

Pelo gráfico, concluímos que a imagem de f é representada pelo conjunto $[-4, 3)$.

6) Quantas soluções possui a equação $f(f(x)) = 2$?

- (a) 3 (b) 4 (c) 6 (d) 7 (e) 8

Solução: Alternativa (D)

Seja $a = f(x)$. Observe que a equação $f(f(x)) = 2$ corresponde a $f(a) = 2$. Encontremos tais valores de a analisando o gráfico. Para que isso ocorra, devemos ter 3 opções para a , indicados respectivamente nas cores vermelha (a_1), azul (a_2) e verde (a_3):

Agora, basta encontrar os valores de x tais que $f(x) = a$ para cada caso:

- Se $a = a_1$, então $f(x) = a_1$ possui uma solução, indicada abaixo:

- Se $a = a_2$, então $f(x) = a_2$ possui duas soluções, indicadas abaixo:

- Se $a = a_3$, então $f(x) = a_3$ possui quatro soluções, indicadas abaixo:

No total, temos $1 + 2 + 4 = 7$ soluções distintas para a equação $f(f(x)) = 2$.

Para as próximas duas questões, considere as funções f e g dadas por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x, & \text{se } x < 3 \\ 2x - 1, & \text{se } x \geq 3 \end{cases} \quad \text{e} \quad g(x) = \begin{cases} x^2 + 2x, & \text{se } x \leq 8 \\ x^3 + 2x - 1, & \text{se } x > 8 \end{cases}$$

7) A soma das raízes reais de f e g é

- (a) $-\frac{5}{2}$ (b) $\frac{7}{2}$ (c) $-\frac{3}{2}$ (d) $\frac{3}{2}$ (e) 0

Solução: Não há alternativa correta - QUESTÃO ANULADA

As raízes de uma função correspondem aos respectivos valores que a anulam. Assim, devemos resolver as equações $f(x) = 0$ e $g(x) = 0$.

- Raízes de f :

Se $f(x) = 0$, então temos duas opções:

- $x^2 - 3x = 0$: Resolvendo esta equação do 2º grau, obtemos como raízes $x = 0$ e $x = 3$. Mas como $f(x) = x^2 - 3x$ apenas se $x < 3$, então concluímos que a única possibilidade nesse caso é $x = 0$;
- $2x - 1 = 0$: Neste caso, temos que $x = \frac{1}{2}$. Mas como $f(x) = 2x - 1$ apenas se $x \geq 3$, e $\frac{1}{2} < 3$, segue que não há raízes nesse caso.

Portanto, a única raiz real de f é $x = 0$.

• Raízes de g :

Se $g(x) = 0$, então temos duas opções:

- $x^2 + 2x = 0$: Resolvendo esta equação do 2º grau, obtemos como raízes $x = 0$ e $x = -2$. Como ambos os valores são menores do que 8, concluímos que ambas são raízes para g .
- $x^3 + 2x - 1 = 0$: Neste caso, veja que $x^3 + 2x - 1 > 0$ sempre que $x > 1^1$ e em particular, para $x > 8$. Daí, não haverá raízes nesse caso.

Portanto, as raízes reais de g são $x = 0$ e $x = -2$.

Finalmente, a soma das raízes reais de f e g corresponde a $0 + 0 + (-2) = -2$.

8) Para $x \in (3, 4)$, o valor de $(f \circ g)(x) - (g \circ f)(x)$ é

- (a) $2(x - 1)^3$ (b) $2(x + 1)(x^2 - x + 1)$ (c) $2(x - 1)(x^2 + x - 1)$
(d) $2(x - 1)(x^2 - x + 1)$ (e) 0

Solução: Não há alternativa correta - QUESTÃO ANULADA

9) Em relação à equação $\log|x^2 + x - 1| = 0$, é possível afirmar que

- (a) não admite solução real (b) admite apenas uma solução real
(c) admite exatamente duas soluções reais (d) admite exatamente três soluções reais
(e) admite exatamente quatro soluções reais

Solução: Alternativa (E)

Para resolver esta questão, lembremos rapidamente da definição de logaritmo:

$$\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b.$$

Quando a base é omitida, normalmente estamos tratando do logaritmo na base 10. No caso dessa questão, isso não faz diferença, pois, chamando $b = |x^2 + x - 1|$, veja que pela definição

$$\log_a b = 0 \Leftrightarrow a^0 = b \Rightarrow b = 1$$

¹Mais exatamente, $x^3 + 2x - 1 > 0$ para $x > -2 \left(\frac{2}{3(9 + \sqrt{177})} \right)^{\frac{1}{3}} + \frac{\left(\frac{1}{2}(9 + \sqrt{177}) \right)^{\frac{1}{3}}}{3^{\frac{2}{3}}} \approx 0,45340$.

Basta portanto analisar a equação $|x^2 + x - 1| = 1$.

Vamos novamente relembrar da definição da função módulo, também chamada de valor absoluto. Se $x \geq 0$, então $|x| = x$. (por exemplo, $|8| = 8$ pois $8 > 0$). Mas se $x < 0$, o sinal de x será negativo, e a função módulo irá retirar este sinal (por exemplo, $|-7| = 7$, pois $-7 < 0$). Mas veja que $7 = -(-7)$. Logo, podemos ver que, se $x < 0$, então $|x| = -x$. Em resumo:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Dessa forma, temos dois casos a verificar:

- Se $x^2 + x - 1 > 0$, então $absx^2 + x - 1 = x^2 + x - 1$. Nesse caso,

$$x^2 + x - 1 = 1 \Rightarrow x^2 + x - 2 = 0.$$

As soluções para esta equação do 2º grau são $x = -2$ e $x = 1$.

- Se $x^2 + x - 1 < 0$, então $absx^2 + x - 1 = -(x^2 + x - 1) = -x^2 - x + 1$. Nesse caso,

$$-x^2 - x + 1 = 1 \Rightarrow -x^2 - x = 0.$$

As soluções para esta equação do 2º grau são $x = -1$ e $x = 0$.

Dessa forma, concluímos que a equação $\log|x^2 + x - 1| = 0$, admite exatamente quatro soluções reais, sendo elas $x = -2$, $x = -1$, $x = 0$ e $x = 1$.

10) O conjunto das soluções reais da inequação

$$|x| + |x - 1| < 7$$

é dado por

(a) $[-1, 0)$ (b) $(-3, -2)$ (c) $(-3, 4)$ (d) $(-3, 3)$ (e) $(-\infty, \infty)$

Solução: Alternativa (C)

Como já discutido anteriormente, sabemos que

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Assim, temos quatro situações para analisar:

- ♦ $x \geq 0$ e $x - 1 \geq 0$:

Nesse caso, temos que $|x| = x$ e $|x - 1| = x - 1$. Logo,

$$x + x - 1 < 7 \Rightarrow 2x - 1 < 7 \Rightarrow 2x < 8 \Rightarrow x < 4$$

♣ $x \geq 0$ e $x - 1 < 0$: Nesse caso, temos que $|x| = x$ e $|x - 1| = -(x - 1) = 1 - x$. Logo,

$$x + 1 - x < 7 \Rightarrow 1 < 7$$

Isto é sempre verdade, logo não há restrições para x nesse caso.

♥ $x < 0$ e $x - 1 \geq 0$: Nesse caso, temos que $|x| = -x$ e $|x - 1| = x - 1$. Logo,

$$-x + x - 1 < 7 \Rightarrow -1 < 7$$

Isto é sempre verdade, logo não há restrições para x nesse caso.

♠ $x < 0$ e $x - 1 < 0$: Nesse caso, temos que $|x| = -x$ e $|x - 1| = -(x - 1) = 1 - x$. Logo,

$$-x + 1 - x < 7 \Rightarrow -2x + 1 < 7 \Rightarrow -2x < 6 \Rightarrow x > -3$$

Desse modo, concluímos que $-3 < x < 4$, e portanto temos que $x \in (-3, 4)$.

11) Seja $x \neq \frac{k\pi}{2}$, com $k \in \mathbb{Z}$. O valor de

$$\frac{\text{sen}(3x)}{\text{sen}(x)} - \frac{\cos(3x)}{\cos(x)}$$

é

(a) -2

(b) -1

(c) 0

(d) 1

(e) 2

Solução: Alternativa (E) Para resolver esta questão, lembremos-nos das seguintes identidades trigonométricas:

$$\text{sen}(a + b) = \text{sen}(a)\cos(b) + \text{sen}(b)\cos(a) \quad (4)$$

$$\cos(a + b) = \cos(a)\cos(b) - \text{sen}(a)\text{sen}(b) \quad (5)$$

Primeiramente, vamos encontrar os valores de $\text{sen}(3x)$ e $\cos(3x)$ em função de $\text{sen}(x)$ e $\cos(x)$.

Utilizando a identidade 4 com $a = 2x$ e $b = x$, veja que

$$\begin{aligned} \text{sen}(3x) &= \text{sen}(2x + x) \\ &= \text{sen}(2x)\cos(x) + \text{sen}(x)\cos(2x) \end{aligned} \quad (6)$$

Utilizando agora as identidades 4 e 5 para calcular $\text{sen}(2x)$ e $\cos(2x)$, temos

$$\begin{aligned} \text{sen}(2x) &= \text{sen}(x + x) = \text{sen}(x)\cos(x) + \text{sen}(x)\cos(x) \\ &= 2\text{sen}(x)\cos(x) \end{aligned} \quad (7)$$

e também

$$\begin{aligned}\cos(x+x) &= \cos(x)\cos(x) - \operatorname{sen}(x)\operatorname{sen}(x) \\ &= \cos(x)^2 - \operatorname{sen}(x)^2\end{aligned}\tag{8}$$

Substituindo (7) e (8) em (9), temos

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(2x)\cos(x) + \operatorname{sen}(x)\cos(2x) &= \left(2\operatorname{sen}(x)\cos(x)\right)\cos(x) + \operatorname{sen}(x)\left(\cos(x)^2 - \operatorname{sen}(x)^2\right) \\ &= 2\operatorname{sen}(x)\cos(x)^2 + \operatorname{sen}(x)\cos(x)^2 - \operatorname{sen}(x)^3 \\ &= 3\operatorname{sen}(x)\cos(x)^2 - \operatorname{sen}(x)^3 \\ &= \operatorname{sen}(x)\left(3\cos(x)^2 - \operatorname{sen}(x)^2\right)\end{aligned}$$

Assim, concluímos que

$$\operatorname{sen}(3x) = \operatorname{sen}(x)\left(3\cos(x)^2 - \operatorname{sen}(x)^2\right)$$

Agora, utilizando a identidade 5 com $a = 2x$ e $b = x$, veja que

$$\begin{aligned}\cos(3x) &= \cos(2x+x) \\ &= \cos(2x)\cos(x) - \operatorname{sen}(x)\operatorname{sen}(2x)\end{aligned}\tag{9}$$

Substituindo (7) e (8) em (9), temos

$$\begin{aligned}\cos(2x)\cos(x) - \operatorname{sen}(x)\operatorname{sen}(2x) &= \left(\cos(x)^2 - \operatorname{sen}(x)^2\right)\cos(x) - \operatorname{sen}(x)\left(2\operatorname{sen}(x)\cos(x)\right) \\ &= \cos(x)^3 - \operatorname{sen}(x)^2\cos(x) - 2\operatorname{sen}(x)^2\cos(x) \\ &= \cos(x)^3 - 3\operatorname{sen}(x)^2\cos(x) \\ &= \cos(x)\left(\cos(x)^2 - 3\operatorname{sen}(x)^2\right)\end{aligned}$$

Assim, concluímos que

$$\cos(3x) = \cos(x)\left(\cos(x)^2 - 3\operatorname{sen}(x)^2\right)$$

Substituindo os valores encontrados na expressão original, temos

$$\begin{aligned}
 \frac{\operatorname{sen}(3x)}{\operatorname{sen}(x)} - \frac{\operatorname{cos}(3x)}{\operatorname{cos}(x)} &= \frac{\operatorname{sen}(x)\left(3\operatorname{cos}(x)^2 - \operatorname{sen}(x)^2\right)}{\operatorname{sen}(x)} - \frac{\operatorname{cos}(x)\left(\operatorname{cos}(x)^2 - 3\operatorname{sen}(x)^2\right)}{\operatorname{cos}(x)} \\
 &= \frac{\operatorname{cos}(x)\operatorname{sen}(x)\left(3\operatorname{cos}(x)^2 - \operatorname{sen}(x)^2\right) - \operatorname{sen}(x)\operatorname{cos}(x)\left(\operatorname{cos}(x)^2 - 3\operatorname{sen}(x)^2\right)}{\operatorname{sen}(x)\operatorname{cos}(x)} \\
 &= \frac{\operatorname{sen}(x)\operatorname{cos}(x)\left(3\operatorname{cos}(x)^2 - \operatorname{sen}(x)^2 - \operatorname{cos}(x)^2 + 3\operatorname{sen}(x)^2\right)}{\operatorname{sen}(x)\operatorname{cos}(x)} \\
 &= \frac{\cancel{\operatorname{sen}(x)\operatorname{cos}(x)}\left(3\operatorname{cos}(x)^2 - \operatorname{sen}(x)^2 - \operatorname{cos}(x)^2 + 3\operatorname{sen}(x)^2\right)}{\cancel{\operatorname{sen}(x)\operatorname{cos}(x)}} \\
 &= 3\operatorname{cos}(x)^2 - \operatorname{sen}(x)^2 - \operatorname{cos}(x)^2 + 3\operatorname{sen}(x)^2 \\
 &= 2\operatorname{cos}(x)^2 + 2\operatorname{sen}(x)^2 \\
 &= 2\left(\operatorname{cos}(x)^2 + \operatorname{sen}(x)^2\right) \\
 &= 2 \cdot 1 \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

onde na penúltima passagem utilizamos a Identidade Fundamental da Trigonometria:

$$\operatorname{sen}^2(x) + \operatorname{cos}^2(x) = 1.$$

Portanto, temos que

$$\boxed{\frac{\operatorname{sen}(3x)}{\operatorname{sen}(x)} - \frac{\operatorname{cos}(3x)}{\operatorname{cos}(x)} = 2}$$

12) Sejam a e b números reais positivos. Na figura abaixo, a linha pontilhada representa o gráfico da função $f(x) = 4 \operatorname{sen}(x)$ e a linha contínua representa o gráfico da função $g(x) = 4a \operatorname{sen}(bx)$.

Pode-se afirmar que

- (a) $0 < a < 1$ e $b > 1$ (b) $0 < a < 1$ e $0 < b < 1$ (c) $a > 1$ e $0 < b < 1$
(d) $a = 1$ e $b > 1$ (e) $0 < a < 1$ e $b = 1$

Solução: Alternativa (B)

Para resolver esta questão, lembremo-nos primeiramente que uma função senoidal genérica h da forma

$$h(x) = A + B\text{sen}(Cx)$$

com $A, B, C \in \mathbb{R}$, possui algumas características importantes que podem ser inferidas a partir dos coeficientes presentes, sendo elas:

- Amplitude: B
- Período: $\frac{2\pi}{C}$
- Imagem: $[A - B, A + B]$

Com base nessas informações, analisemos primeiramente a função f . Como $f(x) = 4\text{sen}(x)$, isso significa que sua amplitude é 4 e seu período é 2π , e seu gráfico corresponde à linha pontilhada. Agora, veja que $g(x) = 4a\text{sen}(bx)$, o que significa que a amplitude de g é $4a$ e seu período é $\frac{2\pi}{b}$. O gráfico de g corresponde à linha contínua, e comparando-o com o gráfico pontilhado, percebemos as seguintes constatações:

- A amplitude de g é **MENOR** do que a amplitude de f ;
- O período de g é **MAIOR** do que o período de f .

Para que a amplitude de g seja menor que a amplitude de f , precisamos que

$$4a < 4 \Rightarrow a < 1$$

Para que o período de g seja maior do que o período de f , precisamos que

$$\frac{2\pi}{b} > 2\pi \Rightarrow 2\pi > 2\pi b \Rightarrow b < 1$$

Como a e b são números reais positivos conforme dito no enunciado, concluímos que

$$\boxed{0 < a < 1} \quad \text{e} \quad \boxed{0 < b < 1}$$

Esta opção está indicada na Alternativa (B).