

Resolva os seguintes exercícios. **Entregue os exercícios 10(d), 11(d), 11(e) até o fim da aula do dia 14/09.** Justifique todas as suas respostas!

1. Verifique se os dois conjuntos geram o mesmo subespaço do espaço vetorial V , nos seguintes casos:

- (a) $S_1 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ e $S_2 = \{(1, 1, 0), (1, -1, 0)\}$, quando $V = \mathbb{R}^3$.
 (b) $S_1 = \{\sin 2t, \cos 2t, \sin t \cos t\}$ e $S_2 = \{1, \sin 2t, \cos 2t\}$, quando $V = C(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ é contínua}\}$.
 (c) $S_1 = \{1, t, t^2, t^3\}$ e $S_2 = \{1, 1+t, 1-t^2, 1-t-t^2\}$, quando $V = P_3(\mathbb{R})$.

2. Ache uma solução não trivial para o sistema

$$\begin{cases} x + 2y + 3z + 4w = 0 \\ 2x + y + z - w = 0 \\ 3x - 2y + z - 2w = 0. \end{cases}$$

A partir desta solução, obtenha uma combinação linear nula dos vetores $v_1 = (1, 2, 3)$, $v_2 = (2, 1, -2)$, $v_3 = (3, 1, 1)$, $v_4 = (4, -1, -2)$ na qual os coeficientes não são todos iguais a zero.

3. Sejam $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$, onde V é um espaço vetorial. Sejam a_2, \dots, a_n números reais não nulos. Mostre que os vetores v_1, \dots, v_n são linearmente independentes se e somente se os vetores

$$v_1, v_1 + a_2 v_2, v_1 + a_3 v_3, \dots, v_1 + a_n v_n$$

são linearmente independentes.

4. Sejam V um espaço vetorial e $E = \{e_1, e_2, e_3\}$ uma base de V . Seja $v \in V$. O conjunto $A = \{v, v - e_1, v - e_2, v - e_3\}$ é um conjunto de geradores de V ? O conjunto A pode ser linearmente independente? Justifique.

5. Determine uma base e a dimensão de cada um dos seguintes subespaços vetoriais abaixo:

- (a) $S = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x - y = w \text{ e } x - 3y + w = 0\}$
 (b) $S = \{A \in \mathcal{M}_{2 \times 2} : AB = BA\}$ onde B é a matriz

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

- (c) $S = \{p \in P_4(\mathbb{R}) : p(1) = p(-1) = 0\}$.

- (d) $S = \left\{ \begin{pmatrix} 2a & a+2b \\ 0 & a-b \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 2} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$.

6. Em $V = \mathbb{R}^4$ considere o subespaço S gerado por $v_1 = (-1, 0, 0, 1)$ e $v_2 = (0, -1, -2, 3)$. Encontre um sistema de equações lineares com 4 incógnitas tal que S é o conjunto de soluções do sistema.

7. Seja $V = \mathcal{M}_{3 \times 3}$ o espaço das matrizes 3×3 com entradas reais e considere

$$S = \{(a_{ij}) \in V : a_{11} + a_{12} + a_{13} = a_{21} + a_{22} + a_{23} = a_{31} + a_{32} + a_{33}\}.$$

(a) Mostre que S é um subespaço de V .

(b) Encontre uma base de S e determine $\dim S$.

(c) Encontre uma base de V que contém a base que você encontrou no item anterior.

8. Seja $B = (1, 2 - x, x^2 + 1, 1 + x + x^3)$. Verifique que B é uma base de $P_3(\mathbb{R})$. Encontre as coordenadas de x^3 na base B .

9. Seja $V = \mathcal{M}_{2 \times 2}$ e considere os seguintes elementos de V :

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

(a) Mostre que $B = (v_1, v_2, v_3, v_4)$ é uma base de V .

(b) Determine $m, n, r, s \in \mathbb{R}$ tais que $P = A$ onde

$$P = (m, n, n, m)_B, \quad A = \begin{pmatrix} r & 1 \\ 2 & s \end{pmatrix}$$

10. Considere os polinômios

$$p_1(x) = 1 + 2x + x^3, \quad p_2(x) = x + x^2 - x^3, \quad p_3(x) = a + x + bx^2 + 5x^3,$$

onde $a, b \in \mathbb{R}$.

(a) Mostre que p_1, p_2 são linearmente independentes.

(b) Mostre que p_1, p_3 são linearmente independentes para todo $a, b \in \mathbb{R}$.

(c) Existe algum valor de $a, b \in \mathbb{R}$ tal que $p_2(x), p_3(x)$ são linearmente dependentes?

(d) Determine todos os valores de $a, b \in \mathbb{R}$ tais que a dimensão do espaço gerado por p_1, p_2 e p_3 seja 2.

11. Considere os seguintes subespaços vetoriais de $V = \mathcal{M}_{3 \times 3}$:

$$S_1 = \{A \in V : A = A^t\}, \quad S_2 = \{A \in V : \text{tr} A = 0\},$$

onde A^t denota a matriz transposta de A e $\text{tr} A$ é o traço de A (a soma dos elementos da diagonal principal de A).

(a) Mostre que S_1 e S_2 são subespaços de V .

- (b) Determine uma base e a dimensão de S_1 .
- (c) Determine uma base e a dimensão de S_2 .
- (d) Determine uma base e a dimensão de $S_1 \cap S_2$.
- (e) Complete a base de $S_1 \cap S_2$ encontrada acima para uma base de V .

12. Considere os seguintes subespaços vetoriais de $V = \mathcal{M}_{3 \times 3}$:

$$S_1 = \{A \in V : A = A^t\}, \quad S_2 = \{A \in V : A = -A^t\},$$

onde A^t denota a matriz transposta de A .

- (a) Determine uma base e a dimensão de S_1 .
- (b) Determine uma base e a dimensão de S_2 .
- (c) Mostre que $S_1 \cap S_2 = \{0\}$.
- (d) Mostre que qualquer matriz 3×3 pode ser escrita de maneira única como uma soma de uma matriz simétrica e uma anti-simétrica (ou seja, $A = A_1 + A_2$ onde $A_1 \in S_1$ e $A_2 \in S_2$).

DICA: Construa uma base B de V onde os primeiros elementos formam uma base de S_1 e os últimos formam uma base de S_2 . Explique como isso resolve o problema.

- (e) Escreva a matriz

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

como uma soma de uma matriz em S_1 e uma em S_2 .