

MAT 0147: Cálculo II Economia (noturno)

Guia 5: Teorema da função implícita e multiplicadores de Lagrange

Prof. M Alexandrino (IME-USP)

2022

Alerta: Este é apenas um guia resumido de parte das transparências das aulas. Ele não substitui as aulas (onde existem discussões, resoluções de exercícios, figuras, etc) e não substitui a leitura da bibliografia recomendada. Figuras foram produzidas com o GeoGebra <http://www.geogebra.org>

Motivação: Estudar máximos e mínimos de funções restrita a vínculos.

Objetivo:

- (▶ 1) Motivação do teorema da função implícita
- (▶ 2) Teorema da função implícita: curva em $\mathbb{R}^2$
- (▶ 3) Teorema da função implícita: superfície em $\mathbb{R}^3$
- (▶ 4) Teorema da função implícita: caso geral
- (▶ 5) Plano tangente a superfície de nível
- (▶ 6) Revisão: multiplicadores de Lagrange (baby version)
- (▶ 7) Multiplicadores de Lagrange: 1 vínculo em $\mathbb{R}^3$
- (▶ 8) Multiplicadores de Lagrange: 2 vínculos em $\mathbb{R}^3$
- (▶ 9) Multiplicador de Lagrange: k -vínculos em $\mathbb{R}^{m+k}$
- (▶ 10) Matriz Hessiana orlada.

Motivação do teorema da função implícita

Seja $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $g(x) = x_1^2 + x_2^2$. Considere a curva de nível $C = g^{-1}(1) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 = 1\}$. Note que ela é **regular** i.e., $\nabla g(p) \neq (0,0), \forall p \in C$, mas não é um gráfico.





Figura: C intercepta $\{x_1 = \frac{1}{2}\}$ em mais de 1 ponto, logo não é gráfico

C não é gráfico, mas é um **gráfico local**, i.e., $\forall p \in C$ existe vizinhança $B_\epsilon(p)$ tal que $C \cap B_\epsilon(p)$ é gráfico de uma função. Ex, se $p = (0, 1)$ então, $\epsilon = 1$ e $h(x) = \sqrt{1 - x^2}$ onde $x \in (-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$. Note que $g(x_1, h(x_1)) = 1$, i.e, h é implícita.



Teorema da função implícita: curva em $\mathbb{R}^2$


Teorema 1

Seja $g : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ função de classe C^1 tal que


$C = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid g(x) = c\}$ é **regular** i.e., $\nabla g(p) \neq (0, 0) \forall p \in C$.

Então C é **gráfico local**. Em outras palavras, para cada $p \in C$, existe vizinhança $B_\epsilon(p)$ tal que $C \cap B_\epsilon(p)$ é gráfico de uma função.

Em particular se $\frac{\partial g}{\partial x_2}(p) \neq 0$ ou seja $N = \nabla g(p) \neq (\lambda, 0)$ então existe função $h: I \rightarrow \mathbb{R}$ com $x_2 = h(x_1)$ e assim $g(x_1, h(x_1)) = c$



Em particular se $\frac{\partial g}{\partial x_1}(p) \neq 0$ ou seja $N = \nabla g(p) \neq (0, \lambda)$ então existe função $h: I \rightarrow \mathbb{R}$ com $x_1 = h(x_2)$ e assim $g(h(x_2), x_2) = c$



Obs Embora por vezes seja difícil determinar explicitamente a função implícita $h : I \rightarrow \mathbb{R}$, é possível **cálcular a derivada** $h'(p_1)$.

De fato se $\frac{\partial g}{\partial x_2}(p) \neq 0$, $h : (p_1 - \epsilon, p_1 + \epsilon) \rightarrow \mathbb{R}$ e $g(x_1, h(x_1)) = c$ podemos definir $\alpha(t) = (t, h(t))$ e derivando $g(\alpha(t)) = c$ em $t = p_1$, temos pela regra da cadeia:

$$0 = \frac{\partial g}{\partial x_1}(p) + \frac{\partial g}{\partial x_2}(p)h'(p_1)$$

e assim concluímos:

$$h'(p_1) = -\frac{\frac{\partial g}{\partial x_1}(p)}{\frac{\partial g}{\partial x_2}(p)}$$

Teorema da função implícita: superfície em $\mathbb{R}^3$


Teorema 2

Seja $g : U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ função de classe C^1 tal que

$S = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid g(x) = c\}$ é **regular** i.e., $\nabla g(p) \neq (0, 0, 0) \forall p \in S$.

Então S é **gráfico local**. Em outras palavras, para cada $q \in S$, existe vizinhança $B_\epsilon(q)$ tal que $S \cap B_\epsilon(q)$ é **gráfico de uma função** (em relação a $\{x_3 = 0\}$ ou $\{x_2 = 0\}$ ou $\{x_1 = 0\}$).

Em particular se $\frac{\partial g}{\partial x_3}(q) \neq 0$ ou seja $N = \nabla g(q) \neq (\lambda_1, \lambda_2, 0)$ então existe função $h : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ com $x_3 = h(x_1, x_2)$ e assim $g(x_1, x_2, h(x_1, x_2)) = c$



De forma análoga:

Se $\frac{\partial g}{\partial x_2}(q) \neq 0$ ou seja $N = \nabla g(q) \neq (\lambda_1, 0, \lambda_2)$ então existe função $h : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ com $x_2 = h(x_3, x_1)$ e assim $g(x_1, h(x_3, x_1), x_3) = c$

Se $\frac{\partial g}{\partial x_1}(q) \neq 0$ ou seja $N = \nabla g(q) \neq (0, \lambda_1, \lambda_2)$ então existe função $h : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ com $x_1 = h(x_2, x_3)$ e assim $g(h(x_2, x_3), x_2, x_3) = c$

Prob: Suponha que $\frac{\partial g}{\partial x_2}(q) \neq 0$ e $g(x_1, h(x_3, x_1), x_3) = c$. Calcule dh


Teorema da função implícita: caso geral

Teorema 3

Seja $G : U \subset \mathbb{R}^{m+k} \rightarrow \mathbb{R}^k$ aplicação de classe C^1 tal que $M = \{x \in \mathbb{R}^{m+k} \mid G(x) = c\}$ é **regular** i.e., $DG(x)$ é sobrejetora $\forall x \in M$. Em outras palavras, os gradientes dos vínculos g_i são linearmente independentes. Então M é **gráfico local**. Em outras palavras, para cada $q \in M$, existe vizinhança $B_\epsilon(q)$ tal que $M \cap B_\epsilon(q)$ é gráfico de uma aplicação $H : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$.

Exemplo 4

Seja $G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definido como $G(x) = (g_1(x), g_2(x))$ onde $g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ e $g_2(x) = x_3$. Note que $C = G^{-1}(1, 0)$ é interseção de $g_1^{-1}(1)$ e $g_2^{-1}(0)$ e que $N_1 = \nabla g_1(x)$ e $N_2 = \nabla g_2(x)$ são L.I para $x \in C$.



Comentários (bordo de uma superfície com bordo):

Sejam $S_i = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid g_i(x) = c_i\}$ superfícies regulares ($i = 1$ ou $i = 2$) e $C = S_1 \cap S_2$ curva onde $\nabla g_1(x)$ e $\nabla g_2(x)$ são linearmente independentes para $x \in C$. Então C é bordo da **superfície com bordo** $S = S_1 \cap \{x \in \mathbb{R}^3 \mid g_2(x) \geq c_2\}$




Figura: $g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$, $g_2(x) = x_3$, $c_1 = 1$, $c_2 = 0$

Plano tangente a superfície de nível

Seja $S = \{x \in U \subset \mathbb{R}^3 \mid g(x) = c\}$ uma superfície regular (i.e., $\nabla g(x) \neq 0 \ \forall x \in S$) onde $g : U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ função de classe C^1 .
Dado $q = (q_1, q_2, q_3) \in S$ definimos **plano tangente no ponto q** (denotado por $T_q S$) como o plano definido pela equação

$$\frac{\partial g}{\partial x_1}(q)(x_1 - q_1) + \frac{\partial g}{\partial x_2}(q)(x_2 - q_2) + \frac{\partial g}{\partial x_3}(q)(x_3 - q_3) = 0$$

Prob Determine o plano tangente ao toro

$S = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid (\sqrt{x_1^2 + x_2^2} - 3)^2 + x_3^2 = 1\}$ passando pelo ponto
 $q = (\frac{7}{4}, \frac{7\sqrt{3}}{4}, \frac{2\sqrt{3}}{4})$.




Figura: $\frac{1}{2}(x_1 - \frac{7}{4}) + \frac{\sqrt{3}}{2}(x_2 - \frac{7\sqrt{3}}{4}) + \sqrt{3}(x_3 - \frac{2\sqrt{3}}{4}) = 0$ é a equação do plano tangente ao toro S

Obs: O plano tangente associado ao gráfico de função $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ pode ser visto como o plano tangente a uma superfície de nível associada a uma função $g : V \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$.

De fato, defina $g(x_1, x_2, x_3) = x_3 - f(x_1, x_2)$. Note que $S = g^{-1}(0) = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid g(x) = 0\}$ é gráfico de f . Então para $q = (p_1, p_2, f(p_1, p_2)) \in S$ temos:

$$\nabla g(q) = \left(-\frac{\partial f}{\partial x_1}(p_1, p_2), -\frac{\partial f}{\partial x_2}(p_1, p_2), 1\right)$$


e assim o plano tangente de S é:

$$-\frac{\partial f}{\partial x_1}(p)(x_1 - p_1) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(p)(x_2 - p_2) + (x_3 - f(p)) = 0$$

Proposição 5 (interpretação geométrica)

Dado uma superfície regular S . As afirmações a seguir são equivalentes:

- (a) existe uma curva diferenciável $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$ com $\alpha'(0) = v_q$;
- (b) $v_q \in T_q S$



Dem: Suponha que (a) seja verdadeiro. Então temos $g(\alpha(t)) = c$. Assim pela regra da cadeia $0 = \langle \nabla g(q), \alpha'(0) \rangle = \langle \nabla g(q), v_q \rangle$ e assim $v_q \in T_q S$ ou seja (b) foi atendido.

Suponha que (b) seja verdadeiro, i.e, $v \in T_q S$, i.e,

$$v_1 \frac{\partial g}{\partial x_1}(q) + v_2 \frac{\partial g}{\partial x_2}(q) + v_3 \frac{\partial g}{\partial x_3}(q) = 0$$

Se $\frac{\partial g}{\partial x_3}(q) \neq 0$ existe $h : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(x_1, x_2, h(x)) = c$. Defina $\beta : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathbb{R}^2$ como $\beta(t) = (q_1, q_2) + t(v_1, v_2)$ e $\alpha(t) = (\beta_1(t), \beta_2(t), h(\beta(t)))$. Assim $g(\alpha(t)) = c$ (i.e, $\alpha \subset S$). Derivando em $t = 0$ temos:

$$0 = \langle \nabla g(q), \alpha'(0) \rangle = v_1 \frac{\partial g}{\partial x_1}(q) + v_2 \frac{\partial g}{\partial x_2}(q) + \alpha'_3(0) \frac{\partial g}{\partial x_3}(q)$$

As duas eq. garantem que $\alpha'_3(0) \frac{\partial g}{\partial x_3}(q) = v_3 \frac{\partial g}{\partial x_3}(q)$, logo $\alpha'_3(0) = v_3$. Assim $\alpha'(0) = v_q$ e $\alpha \subset S$, ou seja (a) é verdadeira.

Comentários (espaço tangente) Sejam $G : U \subset \mathbb{R}^{m+k} \rightarrow \mathbb{R}^k$ de classe C^1 e $M = \{x \in \mathbb{R}^{m+k} \mid G(x) = c\}$ um conjunto regular, i.e., $DG(x)$ é sobrejetor para todo $x \in M$. Em outras palavras $\nabla g_i(x)$ são L.I para todo $x \in M$. Então o **espaço tangente** é definido como $T_q M = \ker DG(q)$ ou seja

$$v_q \in T_q M \text{ sse } \langle v_q, \nabla g_i(q) \rangle = 0 \quad \forall i$$

A interpretação geométrica continua a mesma, ou seja $v_q \in T_q M$ sse existe uma curva $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow M$ com $\alpha'(0) = v_q$.

Revisão: multiplicadores de Lagrange (baby version)

No Guia 3, **aceitando** o teorema da função implícita vimos o seguinte resultado:

Proposição 6

Sejam $g : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ função diferenciável,

$C = g^{-1}(c) = \{x \in U \mid g(x) = c\}$ a curva de nível associada e $u : \tilde{U} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ função diferenciável com domínio $\tilde{U}$ contendo U .

Suponha que:

- (a) $\nabla g(x) \neq (0, 0) \forall x \in C$;
- (b) $u|_C$ (função **restrita a C**) tenha **máximo ou mínimo em um ponto $p \in C$** ;

Então: $\nabla u(p)$ é perpendicular a C em p .

$$\nabla u(p) = \lambda \nabla g(p)$$

$$c = g(p)$$

Exemplo 7

Dado $u(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ e $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ Obtenha os pontos de máximo e mínimo de $u|_C$ onde $C = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 = 1\}$.

Como C é fechado e limitado existe de fato valor máximo e mínimo. Se p é máximo ou mínimo temos:

$$\begin{aligned}(1, 1) = \nabla u(p) &= \lambda \nabla f(p) = \lambda(2p_1, 2p_2) \\ 1 &= p_1^2 + p_2^2\end{aligned}$$

Obs que $p_i \neq 0$. Isto e a primeira eq. implicam que $p_2 = p_1$, o qual substituído na segunda eq. permite concluir que as soluções do sistema são $p = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ e $\tilde{p} = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$

Como $u(p) = \frac{2}{\sqrt{2}}$ e $u(\tilde{p}) = -\frac{2}{\sqrt{2}}$, concluímos que p é o ponto onde u assume o maior valor e $\tilde{p}$ o ponto onde u assume menor valor.




Figura: Dado $u(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ e $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$
 $w_2 = \nabla u(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}) = \lambda \nabla f(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}) = \lambda v_2$ isto não acontece por ex no ponto (1,0).

Exemplo 8 (Cobb-Douglas e orçamento de 2 produtos)

Considere o vínculo $C = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid 2x_1 + x_2 = w \mid x_i \geq 0\}$ onde w é um valor fixo (orçamento). Considere a função Cobb-Douglas $u(x) = x_1^{\frac{1}{2}} x_2^{\frac{1}{2}}$. Determine o máximo de $u|_C$.

Se $s = (s_1, s_2)$ é ponto de máximo, ele deve antender:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2} s_1^{-\frac{1}{2}} s_2^{\frac{1}{2}}, \frac{1}{2} s_2^{-\frac{1}{2}} s_1^{\frac{1}{2}} \right) = \nabla u(s) &= \lambda \nabla f(s) = \lambda(2, 1) \\ w &= 2s_1 + s_2 \end{aligned}$$

Resposta: $s(w) = \left(\frac{w}{4}, \frac{w}{2} \right)$

Comentários (shadow prices): No caso bem particular de Cobb Douglas temos a existência de um **único máximo** $s(w)$ para cada **vínculo** $C_w = g^{-1}(w)$, o que nos dá uma curva diferenciável $w \rightarrow s(w) \in C_w$. Em particular $g \circ s(w) = w$ Por ser máximo temos: $\nabla u(s(w)) = \lambda(w) \nabla g(s(w))$ Assim, ao multiplicar ambos os lados por $s'(w)$ concluímos:

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dw} u \circ s(w) &= \langle \nabla u(s(w)), s'(w) \rangle \\
 &= \lambda(w) \langle \nabla g(s(w)), s'(w) \rangle \\
 &= \lambda(w) \frac{d}{dw} g \circ s(w) \\
 &= \lambda(w)
 \end{aligned}$$




Figura: curvas de máximos no caso particular de u sendo **Cobb Douglas** e vários vínculos dado por orçamentos. Lembre que em problemas gerais de multiplicadores de Lagrange não precisa existir uma curva bem definida $w \rightarrow s(w)$

Multiplicadores de Lagrange: 1 vínculo em $\mathbb{R}^3$

Proposição 9

Sejam $g : U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ função diferenciável,

$S = g^{-1}(c) = \{x \in U | g(x) = c\}$ superfície de nível **regular** associada (i.e., $\nabla g(x) \neq (0, 0, 0) \forall x \in S$) e $u : \tilde{U} \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ função diferenciável com domínio $\tilde{U}$ contendo U . **Suponha que:** $u|_S$ (função **restrita a S**) tenha **máximo ou mínimo em um ponto $q \in S$** ; **Então** $\nabla u(q)$ é perpendicular a S em $q \in S$, i.e.,

$$\begin{aligned}\nabla u(q) &= \lambda \nabla g(q) \\ c &= g(q)\end{aligned}$$

Obs: Neste tipo de problema, a função g é usualmente chamada de **vínculo**.

Dem: Pela definição do plano tangente temos que $\nabla g(q)$ é ortogonal $T_q S$ ou seja:

$$\langle \nabla g(q), w_q \rangle = 0, \quad \forall w_q \in T_q S \quad (1)$$

Pela interpretação geométrica do plano tangente, para cada $v_q \in T_q S$ existe uma curva $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \subset \mathbb{R} \rightarrow S \subset \mathbb{R}^3$ com $\alpha'(0) = v_q$. Visto que $u|_S$ (função **restrita a S**) tem **máximo ou mínimo em** $q \in S$, temos que a função $h(t) = u(\alpha(t))$ tem máximo ou mínimo interior em $t = 0$, i.e., $h'(0) = 0$. Assim, **pela regra da cadeia**, $0 = h'(0) = \langle \nabla u(q), \alpha'(0) \rangle = \langle \nabla u(q), v_q \rangle$. Como isto pode ser feito para qualquer outro $v_q \in T_q S$ concluímos:

$$\langle \nabla u(q), w_q \rangle = 0, \quad \forall w_q \in T_q S \quad (2)$$

ou seja $\nabla u(p)$ é **ortogonal a** $T_q S$. Equações (1) e (2) implicam que

$$\nabla u(q) = \lambda \nabla g(q)$$

o que termina a demonstração.

Exemplo 10 (Cobb-Douglas e orçamento para 3 produtos)

Seja $\{S = x \in \mathbb{R}^3 \mid 6x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 6, x_i > 0\}$ a superfície que representa um vínculo orçamentário de 3 produtos. Considere a função utilidade $u(x) = \sqrt[3]{x_1 x_2 x_3}$. Determine o ponto $q \in S$ onde $u|_S$ assume maior valor e determine tal valor.

Resolvendo o sistema dado por multiplicador de Langrange:

$$\left(\frac{1}{3}x_1^{-\frac{2}{3}}x_2^{\frac{1}{3}}x_3^{\frac{1}{3}}, \frac{1}{3}x_2^{-\frac{2}{3}}x_1^{\frac{1}{3}}x_3^{\frac{1}{3}}, \frac{1}{3}x_3^{-\frac{2}{3}}x_2^{\frac{1}{3}}x_1^{\frac{1}{3}}\right) = \lambda(6, 3, 2)$$
$$6 = 6x_1 + 3x_2 + 2x_3$$

temos que $q = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1)$ e $u(q) = \sqrt[3]{\frac{2}{9}}$. Visto que $\overline{S}$ (fecho de S) é fechado e limitado e que o máximo não acontece no bordo ∂S (onde u é zero) q tem que ser de fato o ponto de máximo.




Figura: superfície de nível $u^{-1}(\sqrt[3]{\frac{2}{9}})$ (associada a **função utilidade** u) tangente ao **vínculo orçamentário** S no **ponto de máximo** q , e o vetor $N = \nabla g(q)$.

Prob: Determine o volume do maior paralelepípedo de faces paralelas aos planos coordenados que pode ser inscrito em

$$S = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid 9x_1^2 + 36x_2^2 + 4x_3^2 = 36\}$$

Resposta: $\frac{16\sqrt{3}}{3} = f\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \sqrt{3}\right)$ onde $f(x) = 8x_1x_2x_3$ representa a função volume e $x_1, x_2, x_3 > 0$ representam as coordenadas do vertice do paralelepípedo contido no primeiro octante e tangentes a S .

Multiplicadores de Lagrange: 2 vínculos em $\mathbb{R}^3$

Proposição 11

Seja $G : U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ aplicação de classe C^1 e $C = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid G(x) = c\}$ curva regular, i.e., $DG(x)$ é sobrejetora para todo $x \in C$ ou seja $\nabla g_1(x)$ e $\nabla g_2(x)$ são L.I para $x \in C$. Seja $u : \tilde{U} \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 com $U \subset \tilde{U}$ e suponha que $u|_C$ (u restrita a C) tenha máximo ou mínimo local em $q \in C$. **Então** $\nabla u(q)$ é perpendicular a C em $q \in C$, i.e.,

$$\nabla u(q) = \lambda_1 \nabla g_1(q) + \lambda_2 \nabla g_2(q)$$

$$c_1 = g_1(q)$$

$$c_2 = g_2(q)$$

Obs: como usual g_i são chamados **vínculos**.


Exemplo 12

Sejam $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ função definida como $u(x) = \frac{3}{4}x_2 + x_3$ e $G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ aplicação $G(x) = (g_1(x), g_2(x))$ onde $g_1(x) = x_1^2 + x_2^2$ e $g_2(x) = x_3$. Considere a curva espacial $C = G^{-1}(9, 4) = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 = 9, x_3 = 4\}$. Determine os pontos onde $u|_C$ assume valor máximo e assume valor mínimo, e diga quais são tais valores.

Visto que C é compacta, existe valor máximo e mínimo global. Assim por multiplicador de Lagrange (2 vínculos) temos:

$$\begin{aligned}(0, \frac{3}{4}, 1) = \nabla u(x) &= \lambda_1(2x_1, 2x_2, 0) + \lambda_2(0, 0, 1) \\ 9 &= x_1^2 + x_2^2 \\ 4 &= x_3\end{aligned}$$

Resolvendo Eq's acima temos que $(0, -3, 4)$ é pt de mínimo global, com valor $\frac{7}{4}$ e $(0, 3, 4)$ é pt de máximo global, com valor $\frac{25}{4}$.



Multiplicador de Lagrange: k -vínculos em $\mathbb{R}^{m+k}$

Teorema 13

Sejam $G : U \subset \mathbb{R}^{m+k} \rightarrow \mathbb{R}^k$ aplicação de classe C^1 definida como $G(x) = (g_1(x), \dots, g_k(x))$ e $M = \{x \in \mathbb{R}^{m+k} \mid G(x) = c\}$ é **regular** i.e., $DG(x)$ é sobrejetora $\forall x \in M$. Em outras palavras, $\{\nabla g_i\}_{i=1}^k$ são linearmente independentes. Seja $u : \tilde{U} \subset \mathbb{R}^{m+k} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 . Suponha que existe $q \in M$ tal que $u|_M$ tem valor máximo ou mínimo local. Então $\nabla u(q)$ é ortogonal a M em q , ou seja:

$$\nabla u(q) = \sum_{i=1}^k \lambda_i \nabla g_i(q)$$

$$c_1 = g_1(q)$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$c_k = g_k(q)$$

Comentários: Matriz Hessiana orlada

Motivação:

Sejam $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $u(x) = \frac{1}{2}(\lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \lambda_3 x_3^2)$, $S = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid g(x) = x_1 = c\}$, $p = (c, 0, 0)$ e $f = u|_S$. Desejamos saber se p é ponto de máximo ou mínimo local de f e ao mesmo tempo motivar a apresentação do critério da Hessiana orlada.

Fácil ver que

- ▶ $f(x_2, x_3) = \frac{1}{2}(\lambda_1 c^2 + \lambda_2 x_2^2 + \lambda_3 x_3^2)$
- ▶ $\text{grad } f(0, 0) = (0, 0)$
- ▶ $\text{Hess } f(0, 0) = \begin{bmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$ Assim pelo Guia 4, p é máximo local de f se $\lambda_2 < 0, \lambda_3 < 0$ e é mínimo se $\lambda_2 > 0, \lambda_3 > 0$

Fizemos uma conta **intrínseca**. Mas e se quisermos fazer uma conta extrínseca, i.e., usando u ? Primeira coisa notamos que

$$\nabla u(p) = (\lambda_1 c, 0, 0) = \lambda \nabla g(p) = \lambda(1, 0, 0)$$

Ou seja, por multiplicador de Lagrange, p é o candidato para ser

máximo ou mínimo. Note também que $\text{Hess } u(p) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$

e assim contém informação a mais (não precisamos saber sinal de λ_1 , se ele for positivo ou negativo não mudará o resultado).

Suponha que voce esteja ensinando um computador a se livrar da informação adicional (i.e., λ_1). Um bom truque é usar a seguinte matriz orlada (colocando $\nabla g(p) = (1, 0, 0)$ no bordo).

$$\overline{H}_3 = \overline{\text{Hess } u} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} \text{ e } \overline{H}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

Visto que $\det \overline{H}_2 = (-1)\lambda_2$ e $\det \overline{H}_3 = (-1)\lambda_2\lambda_3$ concluímos que:

- ▶ Se $\det \overline{H}_2 < 0$ e $\det \overline{H}_3 < 0$, então p é mínimo de f ($\lambda_2 > 0, \lambda_3 > 0$).
- ▶ Se $\det \overline{H}_2 > 0$ e $\det \overline{H}_3 < 0$, então p é máximo de f ($\lambda_2 < 0, \lambda_3 < 0$).

O truque da matriz orlada parece ser bom no caso em que S é um plano.

Matriz H e Teorema

Mas se S não for um plano? Se S tiver curvatura diferente de zero? (vide comentário Guia 4). Para lidar com tal questão no lugar de usar $\text{Hess } u(p)$ precisaremos em geral usar uma outra matriz simétrica H , relacionada ao conceito **hessiano intrínseco** (o qual vamos discutir dentro em breve).

Def: Sejam $S = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid g(x) = c\}$ superfície regular e $p \in S$ é tal que $\nabla u(p) = \lambda \nabla g(p)$, onde u e g são suaves. Definimos:

$$H = \text{Hess } u(p) - \lambda \text{Hess } g(p)$$

Antes de discutir mais sobre H vamos apresentar o Teorema desta seção que foi ilustrado pela nossa motivação.

Teo Seja $p \in S$ com $\nabla u(p) = \lambda \nabla g(p)$. Suponha que $\frac{\partial g}{\partial x_1}(p) \neq 0$.

► Se $\det \overline{H}_2 < 0$ e $\det \overline{H}_3 < 0$ então p é mínimo local de f .

► Se $\det \overline{H}_2 > 0$ e $\det \overline{H}_3 < 0$ então p é máximo local de f .

onde

$$\overline{H}_3 = \overline{H} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial g}{\partial x_1}(p) & \frac{\partial g}{\partial x_2}(p) & \frac{\partial g}{\partial x_3}(p) \\ \frac{\partial g}{\partial x_1}(p) & H_{11} & H_{12} & H_{13} \\ \frac{\partial g}{\partial x_2}(p) & H_{21} & H_{22} & H_{23} \\ \frac{\partial g}{\partial x_3}(p) & H_{31} & H_{32} & H_{33} \end{bmatrix}$$

$$\overline{H}_2 = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial g}{\partial x_1}(p) & \frac{\partial g}{\partial x_2}(p) \\ \frac{\partial g}{\partial x_1}(p) & H_{11} & H_{12} \\ \frac{\partial g}{\partial x_2}(p) & H_{21} & H_{22} \end{bmatrix}$$

Ingredientes da prova:

Seja $S = \{x \in \mathbb{R}^3 | g(x) = c\}$ superfície regular. Uma vez abordado o teorema, iremos investigar alguns conceitos do cálculo intrínseco em S e ingredientes da prova do Teorema (vide Prop 3 e 4).

Em particular, vamos comentar:

- (a) gradiente Riemanniano (intrínseco) de $f : S \rightarrow \mathbb{R}$,
- (b) reformulação intrínseca de multiplicadores de Lagrange,
- (c) Derivada covariante de campos tangentes a S ;
- (d) o conceito de Hessiano Riemanniano (ou intrínseco)
- (e) De volta a discussão extrínseca
- (f) Matriz orlada
- (g) Observações finais

(a) Gradiente Riemanniano (ou intrínstico) de $f : S \rightarrow \mathbb{R}$

Lembremos que sendo $u : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ é diferenciável,

$$du_p X = \langle \nabla u(p), X \rangle, \forall X \in T_p \mathbb{R}^m$$

Agora se a mesma função fica restrita a S , ou seja se $f = u|_S$ então podemos definir o campo **gradiente Riemanniano** $\text{grad } f(p)$ como **o campo tangente a S** que atende:

$$df_p X = \langle \text{grad } f(p), X \rangle, \forall X \in T_p S$$

Em particular $\text{grad } f(p)$ é a **parte tangente** de $\nabla u(p)$, ou seja:

$$\text{grad } f(p) = \nabla u(p) - \left\langle \nabla u(p), \frac{\nabla g(p)}{\|\nabla g(p)\|} \right\rangle \frac{\nabla g(p)}{\|\nabla g(p)\|}$$

(b) Reformulação intrínseca de multiplicadores de Lagrange

Visto que $\text{grad } f(p)$ é a parte tangente de $\nabla u(p)$ podemos reformular multiplicadores de Lagrange como:

Prop 1: Se $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ tem ponto de máximo ou mínimo local $p \in S$ então $\text{grad } f(p) = 0$

(c) Derivada covariante de campos tangentes a S

Inspirado na discussão do $\text{grad } f(p)$ podemos nos perguntar: *Dados campos $\vec{X}$ e $\vec{Y}$ tangentes a S como derivar $\vec{X}$ na direção de $\vec{Y}$ de forma que o resultado continue tangente a S ?* Afinal mesmo os 2 campos sendo tangente, $(D\vec{X})\vec{Y}$ pode não ser tangente a S . A solução será considerar a parte tangente de $(D\vec{X})\vec{Y}$

Definimos então a nova derivada como:

$$\nabla_Y \vec{X}(p) = D\vec{X}(p)Y - \left\langle (D\vec{X}(p)Y), \frac{\nabla g(p)}{\|\nabla g(p)\|} \right\rangle \frac{\nabla g(p)}{\|\nabla g(p)\|}$$

(d) Conceito de Hessiano Riemanniano (ou intrínstico)

Uma vez que sabemos derivar campos $\vec{X}$ tangentes a S , podemos derivar o $\text{grad } f$, definindo o conceito do Hessiano intrínstico ou Riemanniano $\mathcal{H}(p)$.

$$\mathcal{H}(p)(X, Y) = \langle \nabla_X \text{grad } f, Y \rangle, \quad X, Y \in T_p S$$

Prop 2: Seja $p \in S$, com $\text{grad } f(p) = 0$.

- ▶ Se $\mathcal{H}(p)$ é positivo definido (i.e., tenha auto-valores positivo). então $p \in S$ é ponto de mínimo local.
- ▶ Se $\mathcal{H}(p)$ é negativo definido (i.e., tenha auto-valores negativos). então $p \in S$ é ponto de máximo local.

(e) De volta a discussão extrínseca

Usando a definição de $\mathcal{H}$ concluímos que $\forall X, Y \in T_p S$

$$\mathcal{H}(p)(X, Y) = \text{Hess } u(p)(X, Y) - \left\langle \frac{\nabla u}{\|\nabla u\|}(p), \frac{\nabla g}{\|\nabla g\|}(p) \right\rangle \text{Hess } g(X, Y)$$

No caso em que $\nabla u(p) = \lambda \nabla g(p)$, notamos que

$$H|_{T_p S \times T_p S} = \mathcal{H}(p)$$

Assim podemos reformular a Prop 2 da seguinte maneira:

Prop 3 Seja $p \in S$ tal que $\nabla u(p) = \lambda \nabla g(p)$.

- ▶ Se $H|_{T_p S \times T_p S}$ é positivo definido, então $p \in S$ é ponto de mínimo local.
- ▶ Se $H|_{T_p S \times T_p S}$ é negativo definido então $p \in S$ é ponto de máximo local.

(f) **Prop 4:** Seja A matriz simétrica e suponha que existe um plano V tal que a aplicação bilinear associada a A restrita a $V \times V$ seja também simétrica. Ou seja existe aplicação simétrica $\mathcal{H} : V \rightarrow V$ tal que $Y^t A X = Y^t \mathcal{H} X$ para todo $X, Y \in V$. Vamos também supor que $\mathcal{H}$ não seja degenerado. Seja w vetor normal a V . Suponha que $w_1 \neq 0$.

- (a) Se $\det \bar{A}_2 < 0$ e $\det \bar{A}_3 < 0$ então $y^t A x|_{V \times V}$ é positivo definido.
- (b) Se $\det \bar{A}_2 > 0$ e $\det \bar{A}_3 < 0$ então $y^t A x|_{V \times V}$ é negativo definido.

$$\bar{A}_3 = \bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & w_1 & w_2 & w_3 \\ w_1 & A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ w_2 & A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ w_3 & A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}$$

$$\bar{A}_2 = \begin{bmatrix} 0 & w_1 & w_2 \\ w_1 & A_{11} & A_{12} \\ w_2 & A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

(g) Observações finais

Proposições 3 e 4 implicam o Teorema.

Observamos também que as vezes H pode ser expresso com outra notação. De fato, seja $L : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ função definida $L(x, \lambda) = u(x) - \lambda(g(x) - c)$. Então

$$\nabla L(x, \lambda) = (\nabla u(x) - \lambda \nabla g(x), g(x) - c)$$

Se $\nabla u(p) = \lambda \nabla g(p)$ e então H coincide com a matriz 3×3 esquerda superior de $\text{Hess } L(p, \lambda)$.