

Lista 2 com respostas

MAT3210 — 2º SEMESTRE DE 2019

Exercício 1.

Ache e esboce o domínio das funções:

(a) $f(x, y) = \sqrt{y-x} + \sqrt{y-1}$,

(b) $f(x, y) = \ln y - x^3$,

(c) $f(x, y) = \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}$,

(d) $f(x, y) = \sqrt{x+y} + \sqrt{x-y}$,

(e) $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x+y}} + \frac{1}{\sqrt{x-y}}$,

(f) $f(x, y) = \arcsen \frac{y-1}{x}$,

(g) $f(x, y) = \ln xy$,

(h) $f(x, y) = \sqrt{x - \sqrt{y}}$,

(i) $f(x, y) = \sqrt{x - \sqrt{y}}$,

(j) $f(x, y) = \frac{\sqrt{4x - y^2}}{\ln(1 - x^2 - y^2)}$,

(k) $f(x, y) = \ln x - \ln \sen y$.

(l) $f(x, y) = \sqrt{x \sen y}$.

Solução 1.

(a) $D(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq \max\{x, 1\}\}$, o semiplano acima das retas $y = x$ e $y = 1$.

(b) $D(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\}$, o semiplano acima do eixo x .

(c) $D(f) = \mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{E}$, onde $\mathbb{E} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x/a)^2 + (y/b)^2 = 1\}$ é a elipse centrada na origem e raios extremos a no eixo x e b no eixo y .

(d) $D(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq |y|\}$, os pontos não negativos na primeira coordenada situados entre e contendo as retas $y = -x$ e $y = x$.

(e) $D(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > |y-1| \text{ e } x \neq 0\}$, os pontos onde a primeira coordenada é maior que -1 , situados entre as retas $y = -(x+1)$ e $y = x+1$.

(f) $D(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0 \text{ e } y > 0 \text{ ou } x < 0 \text{ e } y < 0\}$, os pontos do primeiro e do terceiro quadrante.

(g) $D(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0 \text{ e } x \geq \sqrt{y}\}$, os pontos no e acima do eixo x , limitados por e contidos na parábola $x = y^2$.

(h) Veja (h)

(i) $D(f) = \mathbb{P} \cap \mathbb{D}$, onde $\mathbb{P} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq (y/2)^2\}$ e $\mathbb{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$ é o disco aberto unitário, ou seja, são os pontos do disco aberto unitário limitados por e contidos na parábola $x = (y/2)^2$.

(j) $D(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0 \text{ e } \sen y > 0\}$. Observe que $D(f)$ é união infinita das semi-faixas.

(k) $D(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < 0 \text{ e } \sen y < 0 \text{ ou } x > 0 \text{ e } \sen y > 0\}$. Observe que $D(f)$ é união infinita das semi-faixas.

Exercício 2.

Esboce as curvas de nível de:

(a) $f(x, y) = 3x + 4y,$

(b) $f(x, y) = xy,$

(c) $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2},$

(d) $f(x, y) = y(x^2 + 1),$

(e) $f(x, y) = \frac{xy - 1}{x^2},$

(f) $f(x, y) = \frac{x + y}{x - y},$

(g) $f(x, y) = (x^2 + y^2)^2 - 2(x^2 - y^2),$
para níveis $c = -1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1.$

Solução 2.(a) As curvas de nível de f correspondentes ao nível c são retas $y = \frac{-3}{4}x + \frac{c}{4}$ para $c \in \mathbb{R}.$ (b) A curva de nível para $c = 0$ é a união dos eixos cartesianos x e $y.$ Caso $c \neq 0,$ as curvas de nível são dadas pelas hipérbolas $y = \frac{c}{x}.$ (c) Como a imagem de f é a semireta positiva $\mathbb{R}_+,$ as curvas de nível de f são circunferências concêntricas de centro na origem e raio $c^{-1/2},$ para cada nível $c > 0.$ (d) As curvas de nível de f correspondentes ao nível c são dadas por $y = \frac{c}{x^2 + 1}.$ (e) As curvas de nível de f correspondentes ao nível c são dadas por $y = cx + \frac{1}{x}.$ (f) As curvas de nível de f correspondentes ao nível $c \neq -1$ são retas $y = \frac{c-1}{c+1}x$ e a curva de nível para $c = -1$ é o eixo $y.$ (g) Para encontrarmos as curvas de nível correspondentes a $c,$ precisamos resolver a equação

$$y^4 + 2(x^2 + 1)y^2 + x^4 - 2x^2 - c = 0.$$

Escrevendo $z = y^2,$ obtemos polinômio de segundo grau cujas raízes são

$$z^+ = -x^2 - 1 + \sqrt{3x^2 + c}, \quad z^- = -x^2 - 1 - \sqrt{3x^2 + c}.$$

Logo a curva de nível correspondente a c será a união das curvas

$$\begin{aligned} \bullet y &= \sqrt{-x^2 - 1 + \sqrt{3x^2 + c}}, & \bullet y &= \sqrt{-x^2 - 1 - \sqrt{3x^2 + c}}, \\ \bullet y &= -\sqrt{-x^2 - 1 + \sqrt{3x^2 + c}}, & \bullet y &= -\sqrt{-x^2 - 1 - \sqrt{3x^2 + c}}. \end{aligned}$$

Observe que as curvas não estão definidas pra todo $x.$ **Exercício 3.**

Esboce os gráficos de:

- (a) $f(x, y) = 1 - 2x - 3y$, (e) $f(x, y) = \sqrt{4x^2 + y^2}$,
 (b) $f(x, y) = 9x^2 + 4y^2$, (f) $f(x, y) = x^2 + 2x + y^2 + 4y$,
 (c) $f(x, y) = x^2 - y^2$, (g) $f(x, y) = e^{\sqrt{x^2 + y^2}}$,
 (d) $f(x, y) = y^2 + 1$, (h) $f(x, y) = \frac{x}{x^2 + 1}$.

Solução 3.

- (a) O gráfico é um plano, intersectando o plano xy na reta $y = \frac{-2}{3}x + \frac{1}{3}$.
 (b) O gráfico é um parabolóide elíptico com parâmetros $a = 1/3$ e $b = 1/2$. Para $c \neq 0$ suas curvas de nível são elipses

$$\frac{x^2}{c/9} + \frac{y^2}{c/4} = 1.$$

- (c) O gráfico é de um parabolóide hiperbólico, com parâmetros $a = b = 1$.
 (d)
 (e)
 (f)
 (g) Um esboço desse gráfico pode ser dado através das curvas de níveis. Em cada nível $e^c > 0$, $c > 0$, temos circunferências

$$x^2 + y^2 = c^2.$$

- (h) Para $\frac{-1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$, as curvas de níveis de $f(x, y)$ são as raízes da equação do segundo grau

$$cx^2 - x + c = 0.$$

Exercício 4.

Calcule as seguintes limites, caso existam. Se não existirem, explique por quê:

- (a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{1}}{xy + y}$, (f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x+y)^3}{x^2 + y^2}$,
 (b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$, (g) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$,
 (c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$, (h) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + 3xy + y^2}{3x^2 + 4y^2}$,
 (d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{sen}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$, (i) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 - y^2}$,
 (e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)x^2y^2}$, (j) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^3 - y}$.

Solução 4.

- (a) O limite não existe.
- (b) O limite é 2.
- (c) O limite não existe.
- (d) O limite é 1.
- (e) O limite não existe.
- (f)
- (g) O limite é 0.
- (h)
- (i) O limite não existe.
- (j) O limite não existe.

Exercício 5.

Determine o conjunto dos pontos de continuidade. Justifique a resposta:

(a) $f(x, y) = \frac{1}{a^2 - x^2 - y^2},$

(b) $f(x, y) = \frac{xy}{y - x^2},$

(c) $f(x, y) = \ln \frac{x - y}{x^2 + y^2},$

(d) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x - 3y}{x^2 + y^2}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

(e) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\text{sen}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

(f) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1 - \cos(\sqrt{x^2 + y^2})}{x^2 + y^2}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

Solução 5.

- (a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \neq a^2\}.$
- (b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \neq x^2\}.$
- (c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > y\}.$
- (d)
- (e)
- (f)