Questão: X, Y esp. métricos, $f: X \rightarrow Y$ contínua e bijetora. Quando $f^{-1}: Y \rightarrow X$ é contínua?

Em geral a resposta é não:

$$X = [0, 2\pi[, Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$$

$$f(t) = (\cos t, \sin t), \quad 0 \leq t < 2\pi$$

Se $(x_m, y_m) \in Y$, $(x_m, y_m) \rightarrow (1, 0)$,

com $y_m < 0, \forall m$, $f^{-1}(x_m, y_m) \rightarrow 2\pi \notin X$

Logo f^{-1} não é contínua em $(1, 0)$.

Teorema: Se X, Y são espaços métricos com X compacto, se $f: X \rightarrow Y$ é contínua e bijetora então $f^{-1}: Y \rightarrow X$ é contínua.

Dem. Vamos demonstrar que dado $F \subset X$

fechado em X então $(f^{-1})^{-1}(F)$ é fechado em Y . De fato, se $F \subset X$ é fechado em X então F é compacto e $\therefore$

$(f^{-1})^{-1}(F) = f(F)$ é compacto em Y
e, em particular, fechado em Y . $\square$

Continuidade uniforme

Seja $f: X \rightarrow Y$ contínua (X, Y : esp. métricos)

Esta propriedade é equivalente à:

$\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon, x) > 0$:

$$(y \in X, d_X(y, x) < \delta \implies d_Y(f(y), f(x)) < \varepsilon)$$

Definição: Seja $f: X \rightarrow Y$. Dizemos que

f é uniformemente contínua em X

se dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que:

$$(\forall x, y \in X, d_X(x, y) < \delta \implies d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon)$$

Exemplo: Suponha que f satisfaça
uma condição de Lipschitz, i.e., que
exista uma constante $k > 0$:

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq k d_X(x, y), \forall x, y \in X$$

Então f é uniformemente contínua.
[dado $\varepsilon > 0$ tome $\delta = \varepsilon / (k+1)$].

Exemplo: $X = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\} =]0, \infty[$

$Y = \mathbb{R}$ ($X =]0, 1]$)

$f : X \rightarrow Y, f(x) = 1/x$.

f não é uniformemente contínua.

Por contradição: suponha que sim.

Então existirá $\delta > 0$ t.q. se $x, y \in X$

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < 1$$

Seja $a \in X$ e tome $x = a, y = a + \frac{\delta}{2}$.

Então $|x - y| = \frac{\delta}{2} < \delta$ e portanto

$$|f(a) - f(a + \frac{\delta}{2})| < 1 \quad \forall a > 0$$

Logo $\left| \frac{1}{a} - \frac{1}{a + \delta/2} \right| < 1, \forall a > 0$

$$\frac{\delta/2}{a(a+\delta/2)} < 1, \forall a > 0$$

$$\text{ou, } \frac{\delta}{2} < \underbrace{a(a+\frac{\delta}{2})}, \forall a > 0 \quad \downarrow$$

$\rightarrow 0$ qdo $a \rightarrow 0$.

Teorema: X, Y : espaços métricos, $f: X \rightarrow Y$ contínua. Se X é compacto então f é uniformemente contínua.

Prova: número de Lebesgue de uma cobertura

Definição: Sejam (X, d) um espaço métrico e $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ uma família de abertos

de X , com $X = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$. Dizemos que

$\lambda > 0$ é um número de Lebesgue de $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ se:

Dado $S \subset X$, $\delta(S) < \lambda$ então existe
 $\alpha \in A$ tal que $S \subset U_\alpha$.

Proposição: Se X é um espaço métrico compacto então dada qualquer família de abertos cuja reunião é igual a X esta admite um número de Lebesgue.

Dem. Por contradição. Seja $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ uma família de abertos de X com

$$X = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$$

que não admite número de Lebesgue.

Em particular $1/n$, $n = 1, 2, \dots$ não é número de Lebesgue de $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$, isto é, para cada n existe $S_n \subset X$, com $\delta(S_n) < 1/n$ e $S_n \not\subset U_\alpha, \forall \alpha \in A$

Note que $S_n \neq \emptyset, \forall n$, e portanto

possa tomar $x_m \in S_m$, $\forall m \in \mathbb{N}$.

Então $\{x_m\}$ é uma sequência em X . Como X é compacto, existe $\{x_{m_k}\}$ t.q. $x_{m_k} \xrightarrow{X} x$. Existe

$\alpha_0 \in A$ tal que $x \in U_{\alpha_0}$. Como

U_{α_0} é aberto então $\exists \pi > 0$ t.q.

$B_{\pi}(x) \subset U_{\alpha_0}$. Finalmente, se $k \in \mathbb{N}$

e se $y \in S_{m_k}$ temos

$$d(y, x) \leq d(y, x_{m_k}) + d(x_{m_k}, x)$$

$$\leq \delta(S_{m_k}) + d(x_{m_k}, x)$$

$$d(y, x) \leq \frac{1}{m_k} + d(x_{m_k}, x)$$

Vamos escolher, agora, o mesmo k :

• Tomo $k_0 \in \mathbb{N} : k \gg k_0 \Rightarrow \frac{1}{m_k} < \frac{\pi}{2}$

• Tomo $k_1 \in \mathbb{N} : k \gg k_1 \Rightarrow d(x_{m_k}, x) < \frac{\pi}{2}$

Logo, se $\bar{k} = \max\{k_0, k_1\}$ então

$d(y, x) < \pi$ se $y \in S_{m_{\bar{k}}}$,

ie, $S_{m_{\bar{k}}} \subset B_{\pi}(x) \subset \bigcup_{\alpha_0} \mathbb{Z}$

Dem. do teorema: Suponha f contínua
e seja $\varepsilon > 0$. Dado $x \in X$ existe

$\delta(x) > 0$ t.q. $y \in B_{\delta(x)}(x) \Rightarrow d_y(f(y), f(x)) < \frac{\varepsilon}{2}$

Logo, se $y_1, y_2 \in B_{\delta(x)}(x)$ então

$$\begin{aligned} d_y(f(y_1), f(y_2)) &\leq d_y(f(y_1), f(x)) + d_y(f(x), f(y_2)) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Resumindo: para cada $x \in X$

existe $B_{\delta(x)}(x)$ t.q.

$$y_1, y_2 \in B_{\delta(x)}(x) \Rightarrow d_X(f(y_1), f(y_2)) < \varepsilon$$

Considere $\{B_{\delta(x)}(x)\}_{x \in X}$. Esta

é uma família de abertos de X com uniões igual a X .

Como X é compacto, existe $\delta > 0$, número de Lebesgue desta família.

Logo, se $p, q \in X$ com $d_X(p, q) < \delta$ então $S = \{p, q\}$ tem diâmetro $< \delta$

e portanto existe $x_0 \in X : S \subset B_{\delta}(x_0)$.

Assim $p, q \in B_{\delta}(x_0)$ e portanto

$$d_Y(f(p), f(q)) < \varepsilon$$