$(X, d_x), (Y, d_y); f: X \rightarrow Y$. f é uniformemente contínua em X se dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $\forall p, q \in X, d_x(p, q) < \delta \Rightarrow d_y(f(p), f(q)) < \varepsilon$

Prop. Se $f: X \rightarrow Y$ é uniformemente contínua e se $\{x_m\}$ é Cauchy em X então $\{f(x_m)\}$ é Cauchy em Y .

Dem. Seja $\varepsilon > 0$. Como f é un. contínua existe $\delta > 0$:

$$p, q \in X, d_x(p, q) < \delta \Rightarrow d_y(f(p), f(q)) < \varepsilon$$

Como $\{x_m\}$ é Cauchy, existe n_0 :

$$m, n \geq n_0 \Rightarrow d_x(x_m, x_n) < \delta$$

Logo, $m, n \geq n_0 \Rightarrow d_y(f(x_m), f(x_n)) < \varepsilon$

Teorema: Sejam $E \subset \mathbb{R}^N$ limitado
e $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ unif. contínua.
Então f é limitada, ie, $f(E)$
é limitado em $\mathbb{R}$.

Lembrar: $E =]0, 1] \subset \mathbb{R}$ ($N=1$)

$f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$. Temos

$f(E) = [1, \infty[$ (não limitado)

Logo f não unif. contínua

Dem. Suponha que f não
seja limitada. Logo, p/
todo $n \in \mathbb{N}$, $f(E) \not\subset [-n, n]$

Assim, para todo $n \exists x_n \in E$

tal que $|f(x_m)| > m$. Então $\{x_m\}$ é uma sequência em E .

Como E é limitado, $\{x_m\}$ é uma sequência limitada em $\mathbb{R}^N$ e portanto, pelo teorema de Weierstrass, $\exists \{x_{m_k}\}$ convergente. Em particular $\{x_{m_k}\}$ é Cauchy o que implica que $\{f(x_{m_k})\}$ é de Cauchy, pois f é um cont. Logo $\{f(x_{m_k})\}$ é limitada.

Assim $\exists M > 0 : |f(x_{m_k})| \leq M$

para todo k e portanto

$$m_k < |f(x_{m_k})| \leq M, \forall k.$$

Isto é uma contradição $\square$

Continuidade e conexidade

Teorema: Sejam X, Y espaços métricos e $f: X \rightarrow Y$ contínua. Se X for conexo então $f(X)$ é conexo.

Dem. Suponha $f(X)$ desconexo

Então existem U_1, U_2 abertos em Y tais que:

1) $U_1 \cap f(X) \neq \emptyset$

2) $U_2 \cap f(X) \neq \emptyset$

$$3) [U_1 \cap f(X)] \cap [U_2 \cap f(X)] = \emptyset$$

$$4) [U_1 \cap f(X)] \cup [U_2 \cap f(X)] = f(X)$$

Sejam $V_1 = f^{-1}(U_1)$, $V_2 = f^{-1}(U_2)$

Como f é contínua, V_1 e V_2 são abertos em X .

- $V_1 \neq \emptyset$. $\exists y \in U_1 \cap f(X)$. Seja $x \in X$: $f(x) = y$. Então $x \in V_1$ pois $y \in U_1$.
- $V_2 \neq \emptyset$ (mesmo argumento)
- $V_1 \cap V_2 = \emptyset$. De fato, seja $\bar{x} \in V_1 \cap V_2$. Então $f(\bar{x}) \in U_1$

e $f(\bar{x}) \in U_2$. Mas $f(\bar{x}) \in f(X)$ e $\therefore f(\bar{x}) \in U_1 \cap U_2 \cap f(X)$

- $V_1 \cup V_2 = X$. De fato, se $x \in X$ então $f(x) \in f(X)$ e portanto ou $f(x) \in U_1$ ou $f(x) \in U_2$. Logo, ou $x \in V_1$ ou $x \in V_2$.

Em resumo: $f(X)$ desconexo
 $\implies X$ desconexo

Condição: Sejam X espaço métrico conexo e $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Sejam $x, y \in X$ e suponha que $t \in \mathbb{R}$,

$f(x) < t < f(y)$. Então $\exists z \in X$:

$f(z) = t$ [Teorema do valor intermediário]

Dem. X conexo $\Rightarrow f(X)$ conexo em $\mathbb{R} \Leftrightarrow f(X)$ é um intervalo.

Sequências de funções

X : conjunto não vazio.

Para cada $m \in \mathbb{N}$, seja $f_m: X \rightarrow \mathbb{R}$

$\{f_m\}_{m \in \mathbb{N}} = \{f_m\}$: sequência de funções de X em $\mathbb{R}$.

Para cada $x \in X$, $\{f_m(x)\}$

é uma sequência de números reais.

Definição: Seja $f: X \rightarrow \mathbb{R}$.

Dizemos que a sequência $\{f_n\}$ converge pontualmente

para f se, para cada $x \in X$,

$f_n(x) \xrightarrow{\mathbb{R}} f(x)$. Escrevemos

$f_n \xrightarrow{p} f$. Isto significa:

Dado $x \in X$, dado $\varepsilon > 0$

existe $m_\varepsilon = m_\varepsilon(\varepsilon, x) \in \mathbb{N}$ t.q.

$n \geq m_\varepsilon \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$

Divergência com exemplos

1) X espaço métrico, $f_m: X \rightarrow \mathbb{R}$
cada uma delas contínua.

$$f_m \xrightarrow{p} f \stackrel{?}{\implies} f \text{ contínua}$$

Resposta: não.

$$X = [0, 1], \quad f_m(x) = x^m.$$

$$f_m \xrightarrow{p} f \quad \text{onde} \quad f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

$$x^m = e^{m \log x} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0, \quad 0 \leq x < 1$$

2) $X =]a, b[$ $a < b$, $\{f_m\}$

tal que f_m são continuamente diferenciáveis em $]a, b[$, $f_m \xrightarrow{p} f$ e assumamos também que f seja continuamente diferenciável. É verdade que $f_m \xrightarrow{p} f'$?

Resp. $]a, b[= \mathbb{R}$

$$f_m(x) = \frac{1}{\sqrt{m}} \sin(mx)$$

$$\left| f_m(x) \right| = \frac{1}{\sqrt{m}} \left| \sin(mx) \right| \leq \frac{1}{\sqrt{m}}$$

e portanto $f_m \xrightarrow{p} 0$

Mas $f'_m(0) = \sqrt{m} \rightarrow \infty$

$$3) X = [a, b], f_m \xrightarrow{P} f$$

f_m, f : contínuas em $[a, b]$.

É verdade que $\int_a^b f_m(x) dx \rightarrow \int_a^b f(x) dx$?

Resposta: não

$$f_m(x) = mx(1-x^2)^m, x \in [0, 1]$$

$$f_m(0) = 0, f_m(1) = 0. \text{ Para}$$

$$0 < x < 1,$$

$$f_m(x) = mx e^{m \log(1-x^2)} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$$

[usando o seguinte fato,
 $\forall p \in \mathbb{N}, a > 0 \quad t \in \mathbb{R} \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} 0$]

Logo $f_m \xrightarrow{p} 0$. Agora

$$\int_0^1 f_m(x) dx = m \int_0^1 x(1-x^2)^m dx$$

$$\begin{aligned} x^2 &= y \\ x dx &= \frac{1}{2} dy \end{aligned}$$

$$= \frac{m}{2} \int_0^1 (1-t)^m dt$$

$$= \frac{m}{2} \left[-\frac{(1-t)^{m+1}}{m+1} \right]_0^1$$

$$= \frac{m}{2} \frac{1}{m+1}$$