

**EXERCÍCIOS DE MATEMÁTICA DISCRETA**  
**2o. SEMESTRE DE 2002**

1. [Erdős] Sejam  $x_1, \dots, x_n$  números reais. Considere as  $2^n$  somas da forma

$$x_{i_1} + \dots + x_{i_k},$$

onde  $i_1 < \dots < i_k$  e  $k \geq 0$ . Digamos que um conjunto  $S$  dessas somas seja *pequeno* se quaisquer dois membros de  $S$  distem  $< 1$  (a diferença é menor que 1). Determine o tamanho máximo de um conjunto pequeno supondo que os  $x_i$  sejam todos tais que  $|x_i| \geq 1$ . Isto é, determine  $f(n)$  para todo  $n \geq 0$ , onde definimos  $f(n)$  como sendo

$$\max_{x_1, \dots, x_n} \max\{|S| : S \text{ é pequeno}\}$$

e o (primeiro) máximo é tomado sobre todas as seqüências  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$  com  $|x_i| \geq 1$  para todo  $i$ . {Data de entrega: 22/8/2002}

2. (+) [Kleitman] Seja  $B$  um espaço normado. (Se você não está familiarizado com espaços normados, suponha que  $B$  é o  $\mathbb{R}^d$  para algum  $d$ .) Determine  $f(n)$  para todo  $n \geq 0$ , onde definimos  $f(n)$  como sendo

$$\max_{x_1, \dots, x_n} \max\{|S| : S \text{ é pequeno}\}$$

e o (primeiro) máximo é tomado sobre todas as seqüências  $x_1, \dots, x_n \in B$  com  $\|x_i\| \geq 1$  para todo  $i$  (isto é, todos os  $x_i$  têm norma pelo menos 1).

Naturalmente, este problema se reduz ao Ex. 1 se  $B$  é  $\mathbb{R}$ .

3. [Erdős–Szekeres] Prove que toda seqüência  $a_0, \dots, a_{n^2}$  contém uma subsequência monótona com  $n+1$  elementos, isto é, uma subsequência não-crescente ou uma subsequência não-decrescente com  $n+1$  elementos. Mais precisamente, prove que existem  $0 \leq i_0 < \dots < i_n \leq n^2$  com  $a_{i_0} \leq \dots \leq a_{i_n}$  ou com  $a_{i_0} > \dots > a_{i_n}$ . {Data de entrega: 27/8/2002}
4. Seja  $P$  uma ordem parcial infinita que não contenha uma anticadeia com mais de  $m$  elementos ( $m \in \mathbb{N}$ ). Deduza da versão finita do teorema de Dilworth que  $P$  pode ser coberta por uma família de  $m$  cadeias. [Sugestão. Considere o espaço topológico compacto  $[m]^P$  das funções de  $P$  em  $[m] = \{1, \dots, m\}$ . Caso você não tenha familiaridade com topologia (elementar), dê uma demonstração “puramente combinatória” para o caso em que  $P$  é enumerável.]
5. Fixe um inteiro positivo  $n$  e considere a ordem parcial  $P_n = ([n], \preceq)$  sobre  $[n]$  com  $x \preceq y$  se e só se  $x$  divide  $y$ . Encontre uma anticadeia  $A$

em  $P_n$  e uma partição em cadeias  $\mathcal{C}$  de  $P_n$  com  $|A| = |\mathcal{C}|$ . Deduza que  $A$  é máximo e  $|\mathcal{C}|$  é mínimo e assim determine o valor de  $\alpha(P_n) = \beta(P_n)$ . {Data de entrega: 29/8/2002}

6. [Kővári, Sós, e Turán]

(i) Seja  $G = G^n$  um grafo  $r$ -regular (todos os vértices têm grau  $r$ ), com  $r \geq cn$  para alguma constante  $c > 0$ . Conte o número de cópias do grafo  $K^2(1, s)$  em  $G$  e, usando que

$$n \binom{r}{s} \geq s \binom{n}{s} \text{ para } n \geq n_0(s, c), \quad (1)$$

deduza que se  $n$  é suficientemente grande, então  $G$  contém  $K^2(s, s)$ . (Não deixe de provar (1).)

(ii) Use as idéias em (i) e a desigualdade

$$\frac{1}{n} \sum_{x \in V(G)} \binom{d(x)}{s} \geq \binom{n^{-1} \sum_{x \in V(G)} d(x)}{s} \quad (2)$$

para provar que  $\text{ex}(n, H) = o(n^2)$  (isto é,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{ex}(n, H)/n^2 = 0$ ) para todo grafo bipartido  $H$ . (Você sabe provar (2)?)

(iii) Conclua que  $\text{ex}(n, H) = o(n^2)$  se e só se  $H$  é bipartido.

{Data de entrega: 10/9/2002}

7. Seja  $G$  um grafo infinito. A *densidade superior*  $\bar{\sigma}(G)$  de  $G$  é definida como sendo

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sigma_n(G), \quad (3)$$

onde

$$\sigma_n(G) = \sup\{\sigma(G[W]): W \subset V(G), |W| = n\}, \quad (4)$$

e  $\sigma(G[W])$  denota a densidade  $e(G[W]) \binom{|W|}{2}^{-1}$  do grafo  $G[W] = (W, E(G) \cap \binom{W}{2})$  induzido por  $W$  em  $G$ . Deduza do teorema de Erdős e Stone que as únicas densidades superiores possíveis são

$$0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \dots, 1.$$

Isto é

$$\{\bar{\sigma}(G): G \text{ grafo infinito}\} = \left\{1 - \frac{1}{t}: t \in \mathbb{N}\right\} \cup \{1\}.$$

8. [Erdős] Seja  $f^{(d)}(n)$  o número máximo de vezes que a distância 1 ocorre em uma configuração de  $n$  pontos em  $\mathbb{R}^d$ . Mostre que  $f^{(2)}(n) = O(n^{3/2})$ . [Sugestão. Prove que  $\text{ex}(n, K^{(2)}(2, 3)) = O(n^{3/2})$  usando o método do Ex. 6 e use este resultado ( $K^{(2)}(2, 3)$  é o grafo bipartido completo com classes de vértices de cardinalidades 2 e 3).] {Data de entrega: 12/9/2002}

9. (+) (Continuação do Ex. 8) Mostre que  $f^{(2)}(n)$  é superlinear, isto é,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(2)}(n)/n = \infty.$$

10. Seja  $\mathcal{H} \subset \binom{[n]}{k}$  um hipergrafo  $k$ -uniforme. Para  $\mathbf{x} = (x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^n$ , seja

$$\lambda_{\mathcal{H}}(\mathbf{x}) = \sum_{H \in \mathcal{H}} \prod_{i \in H} x_i. \quad (5)$$

Em palavras, para cada hiperaresta  $H$  de  $\mathcal{H}$ , consideramos o monômio  $\prod_{i \in H} x_i$ , e consideramos a soma de todos estes monômios. Pomos

$$\Delta = \left\{ \mathbf{x} = (x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^n : \sum_{1 \leq i \leq n} x_i = 1 \text{ e } x_i \geq 0 \text{ para todo } i \right\} \quad (6)$$

e

$$\lambda^*(\mathcal{H}) = \sup\{\lambda_{\mathcal{H}}(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in \Delta\}. \quad (7)$$

Para  $\mathbf{x} = (x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^n$ , seja

$$\text{supp}(\mathbf{x}) = \{i \in [n] : x_i \neq 0\}. \quad (8)$$

Segue da compacidade de  $\Delta$  que  $\lambda^*(\mathcal{H}) = \lambda_{\mathcal{H}}(\mathbf{x}^*)$  para algum  $\mathbf{x}^* = (x_i^*)_{1 \leq i \leq n} \in \Delta$ . Podemos, ademais, escolher  $\mathbf{x}^*$  de forma que a cardinalidade de  $\text{supp}(\mathbf{x}^*)$  seja a menor possível.

- [Frankl e Rödl] Prove que para todo  $i$  e  $j \in \text{supp}(\mathbf{x}^*)$ , existe  $H \in \mathcal{H}$  tal que  $\{i, j\} \subset H \subset \text{supp}(\mathbf{x}^*)$ .
11. [Motzkin e Straus] (Continuação do Ex. 10)
- (i) Mostre que  $\lambda^*(\mathcal{H}) \geq |\mathcal{H}|/n^k$ .
  - (ii) Suponha agora que  $k = 2$ , isto é, estamos falando de grafos. Seja  $\omega(H)$  o número máximo de vértices mutuamente adjacentes em  $H$ , isto é,  $\omega(H) = \max\{k : H \text{ contém } K^k\}$ . Mostre que

$$\lambda^*(H) \leq \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\omega}\right). \quad (9)$$

- (iii) Deduza o seguinte corolário do teorema de Turán: para todo  $t \geq 1$ , temos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{ex}(n, K^{t+1}) \binom{n}{2}^{-1} = 1 - \frac{1}{t}. \quad (10)$$

{Data de entrega: 17/9/02}

12. Para inteiros  $t \leq n$ , ponha

$$g(n, t) = \max |\mathcal{F}| \quad (11)$$

onde o máximo é tomado sobre todos os  $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}([n]) = 2^{[n]}$  que são  $t$ -intersectantes, isto é, para todo  $F$  e  $F' \in \mathcal{F}$ , temos  $|F \cap F'| \geq t$ . (Note que, aqui, não estamos considerando  $r$ -grafos para algum  $r$  fixo, mas sistemas de conjuntos sem restrição de cardinalidade para seus membros).

- (i) Mostre que  $g(n, 1) = 2^{n-1}$ .

- (ii) Mostre que, para todo inteiro  $t \geq 2$ , temos  $g(n, t) = (1+o(1))2^{n-1}$ . Isto é, prove que  $\lim_{n \rightarrow \infty} g(n, t)2^{-n+1} = 1$ . [Sugestão. Use a fórmula de Stirling

$$n! = (1 + o(1)) \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \quad (12)$$

para provar que

$$\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor + k} = (1 + o(1))2^n \sqrt{\frac{2}{\pi n}} = o(2^n), \quad (13)$$

para todo  $k \in \mathbb{Z}$  fixo. Deduza que

$$\sum_{k \geq (n+t)/2} \binom{n}{k} = (1 + o(1))2^{n-1},$$

e use esse fato.]

{Data de entrega: 19/9/2002}

13. Provamos que, para todo primo  $p$ , temos que o número cromático do  $\mathbb{R}^n$  satisfaz

$$c(4p-1) \geq \binom{4p-1}{2p-1} \left( \sum_{0 \leq j < p} \binom{4p-1}{j} \right)^{-1}. \quad (14)$$

(i) Prove que

$$\sum_{0 \leq j < p} \binom{4p-1}{j} \leq \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \dots\right) \binom{4p-1}{p-1} \leq \frac{3}{2} \binom{4p-1}{p-1}.$$

(ii) Use a fórmula de Stirling (12) para deduzir que

$$\binom{n}{\alpha n} = \left( \frac{1}{\alpha^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha}} \right)^{(1+o(1))n},$$

ou, equivalentemente,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \binom{n}{\alpha n} = H(\alpha),$$

onde  $H(\alpha) = \alpha \log(1/\alpha) + (1-\alpha) \log(1/(1-\alpha))$  é a assim chamada função entropia.

(iii) Prove que o lado direito de (14) é pelo menos  $(1.139)^{4p-1}$  se  $p$  é suficientemente grande.

{Data de entrega: 24/9/2002}

14. O Exercício 13 mostra que  $c(4p-1) \geq (1.139)^{4p-1}$  para todo primo  $p$  suficientemente grande. Seja  $\pi(x)$  o número de números primos  $p \leq x$ . O bem conhecido teorema dos números primos diz que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \pi(x) \frac{\log x}{x} = 1.$$

Use esse resultado para provar que  $c(n) \geq (1.13)^n$  para todo  $n$  suficientemente grande.

15. Seja  $p$  um primo. Construa um conjunto  $X$  de  $\binom{4p}{2p}$  pontos em  $\mathbb{R}^{4p-1}$  com a seguinte propriedade: *todo*  $X' \subset X$  que não contém dois elementos ortogonais é tal que

$$|X'| \leq 2 \sum_{0 \leq j < p} \binom{4p}{j}.$$

[*Sugestão.* Considere vetores com coordenadas  $\pm 1$  em  $\mathbb{R}^{4p}$  com o mesmo número de  $+1$ s e  $-1$ s.] Use esse conjunto  $X$  para construir conjuntos  $Y \subset \mathbb{R}^d$  que desprovam a conjectura de Borsuk, onde  $d = \binom{4p-1}{2}$ . [*Sugestão.* Considere a aplicação

$$g: (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq 4p-1} \mapsto (a_{ij})_{1 \leq i < j \leq 4p-1},$$

que leva matrizes  $(4p-1) \times (4p-1)$  em matrizes triangulares superiores.] {*Data de entrega:* 26/9/2002}

16. [Problema de Witsenhausen; Frankl e Wilson] Seja  $S^d \subset \mathbb{R}^{d+1}$  a esfera unitária em  $\mathbb{R}^{d+1}$ :

$$S^d = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{d+1} : \|\mathbf{x}\| = 1\}.$$

Pomos

$$\mu(d) = \sup_E \frac{\mu_d(E)}{\mu_d(S^d)}, \quad (15)$$

onde o supremo é tomado sobre todos os conjuntos (mensuráveis)  $E \subset S^d$  que não contém dois vetores ortogonais, e  $\mu$  denota a medida de Lebesgue  $d$ -dimensional. Mostre que  $\mu(d) \leq (1 - \varepsilon)^d$  para alguma constante absoluta  $\varepsilon > 0$ . [*Observação.* A única dificuldade desse exercício está na teoria da medida envolvida, pois tudo se resume em uma aplicação do teorema de Fubini. Aqueles que não têm familiaridade suficiente com a teoria da medida podem dar um “argumento informal” para provar esse resultado.]

17. [Frankl e Wilson]  
 (i) Seja  $\mathcal{A} \subset \binom{[n]}{k}$  um sistema de  $k$ -conjuntos e  $L$  um conjunto de  $s$  inteiros. Suponha que, para todo  $A$  e  $A' \in \mathcal{A}$  distintos, temos  $|A \cap A'| \in L$ . Prove que

$$|\mathcal{A}| \leq \sum_{0 \leq j \leq s} \binom{n}{j}. \quad (16)$$

- (ii) Sejam  $p$  um primo e  $n$  um inteiro positivo, e considere o grafo completo  $K$  com conjunto de vértices

$$V = \binom{[n]}{p^2 - 1}. \quad (17)$$

Pinte a aresta  $\{A, B\}$  de  $K$  de azul se

$$|A \cap B| \equiv -1 \pmod{p} \quad (18)$$

e de vermelho caso contrário. Seja  $\alpha(n, p)$  o número máximo de vértices em um subgrafo completo vermelho em  $K$ , e seja  $\omega(n, p)$  o número máximo de vértices em um subgrafo completo azul em  $K$ . Prove que se  $p - 1 \leq (n + 1)/3$ , então

$$\alpha(n, p), \omega(n, p) < 2 \binom{n}{p-1}. \quad (19)$$

{Data de entrega: 3/10/2002}

18. (Continuação do Ex. 17) Use o teorema dos números primos (veja Ex. 14) e umas estimativas simples para coeficientes binomiais para mostrar que, escolhendo  $n = p^3$ , a coloração definida acima prova (construtivamente!) o seguinte: *para todo  $\varepsilon > 0$ , se  $t \geq t_0(\varepsilon)$ , o número de Ramsey  $R(t)$  satisfaz*

$$R(t) \geq \exp \left\{ \left( \frac{1}{4} - \varepsilon \right) \frac{(\log t)^2}{\log \log t} \right\}. \quad (20)$$

A cota inferior para  $R(t)$  em (20) é a melhor que se sabe provar de forma construtiva.

19. Fixe um inteiro positivo  $n$ . Nesta questão, escrevemos  $\{x < y\}$  para um par de inteiros  $\{x, y\}$  com  $x < y$ . Considere o grafo  $\Gamma = \Gamma_n$  cujos vértices são os pares  $\{x, y\} \subset [n]$  e cujas arestas são todos os pares de vértices da forma

$$\{\{x < y\}, \{y < z\}\}.$$

( $\Gamma = \Gamma_n$  tem  $\binom{n}{2}$  vértices e  $\binom{n}{3}$  arestas.) Observe que  $\Gamma$  não tem triângulos. Mostre que, dado qualquer inteiro  $k$ , existe  $n_0$  tal que se  $n \geq n_0$ , então o número cromático de  $\Gamma = \Gamma_n$  é pelo menos  $k$ .

{Data de entrega: 15/10/2002}

20. [de Bruijn e Erdős] Seja  $G = (V, E)$  um grafo e  $k$  um inteiro. Suponha que  $\chi(G) \geq k$ . Prove que  $G$  contém um subgrafo *finito*  $H$  com  $\chi(H) \geq k$ . Equivalentemente, mostre que existe  $W \subset V$  *finito* com o grafo  $G[W]$  induzido por  $W$  em  $G$  tal que  $\chi(G[W]) \geq k$ . O grafo  $G[W]$  tem, por definição, conjunto de vértices  $W$  e conjunto de arestas

$$\binom{W}{2} \cap E.$$

21. [Erdős e Hajnal] Fixe um inteiro  $d$  e um real  $\varepsilon > 0$ . O grafo de Borsuk  $B(d, \varepsilon)$  tem como conjunto de vértices

$$S^d = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{d+1}: \|\mathbf{x}\| = 1\}$$

e  $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\} \subset S^d$  é uma aresta de  $B(d, \varepsilon)$  se

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \geq 2 - \varepsilon.$$

Prove que para todo  $k$  e  $\ell$  inteiros, existem  $d$  e  $\varepsilon > 0$  tais que  $B(d, \varepsilon)$  tem número cromático  $\geq k$  e cintura ímpar  $\geq 2\ell + 1$ . A *cintura*

ímpar  $\text{og}(G)$  de um grafo  $G$  é o comprimento mínimo de um circuito de comprimento ímpar em  $G$ :

$$\text{og}(G) = \min\{2r + 1: \exists x_0, \dots, x_{2r} \in V(G) \text{ distintos} \\ \text{com } \{x_{i-1}, x_i\} \in E(G) \text{ para todo } i \text{ (índices mod } 2r + 1)\}$$

[*Sugestão.* Use o teorema de Borsuk: se cobrimos a esfera  $S^d$  com  $d+1$  fechados (respectivamente, abertos), sempre há um par de pontos antípodas em um dos fechados (respectivamente, abertos).]

Deduzza do Ex. 20 que  $B(d, \varepsilon)$  (com  $d$  e  $\varepsilon$  apropriados) contém subgrafos finitos  $G$  com  $\chi(G) \geq k$  e  $\text{og}(G) \geq 2\ell + 1$ .

22. (Continuação do Ex. 21) Nesta questão, dizemos que um grafo  $G$  tem a propriedade  $P(c)$  se todo subgrafo  $H$  de  $G$  é tal que  $\alpha(H) \geq c|V(H)|$ .
- (i) Mostre que se  $G$  é tal que  $\chi(G) = k$ , então  $G$  tem a propriedade  $P(1/k)$ .
  - (ii) Mostre que se  $G$  tem a propriedade  $P(1/2)$ , então  $\chi(G) \leq 2$ .
  - (iii) Mostre que para todo inteiro  $k$  e  $0 < c < 1/2$ , existe um grafo  $G$  que tem a propriedade  $P(c)$  mas  $\chi(G) \geq k$ . [*Sugestão.* Mostre que  $B(d, \varepsilon)$  com  $d$  e  $\varepsilon$  apropriados é um tal grafo.]
23. Suponha que

$$p = p(n) = \frac{\log n + f}{n}, \quad (21)$$

onde  $f = f(n)$ , e considere o grafo aleatório  $G(n, p)$ . Prove que as seguintes asserções valem para quase todo  $G = G(n, p)$ .

- (i) Se  $f = f(n) \rightarrow \infty$ , então  $G$  não tem vértices isolados.
  - (ii) Se  $f = f(n) \rightarrow -\infty$  e  $|f| \leq \log n$ , então  $G$  tem vértices isolados.
- De fato, o número de vértices isolados  $X = X(G)$  em  $G$  satisfaz

$$X \sim \exp\{-f\}.$$

- (iii) O que você consegue dizer sobre o caso em que  $f = f(n) \rightarrow f_0$  para alguma contante  $f_0$ ?

{Data de entrega: 17/10/2002}

24. Considere  $[n] = \{1, \dots, n\}$  e suponha que sorteamos um subconjunto aleatório  $R$  de  $[n]$  colocando  $x \in [n]$  em  $R$  com probabilidade  $p$ , independentemente para cada  $x$ . Considere a propriedade  $\text{PA}_k$  de  $R$  conter uma progressão aritmética de  $k$  elementos, onde  $k \geq 3$  é um inteiro fixo, independente de  $n$ . Mostre que  $p^* = p^*(n) = n^{-2/k}$  é uma função limiar para a propriedade  $\text{PA}_k$ . {Data de entrega: 22/10/2002}.
25. Considere a identidade

$$\sum_{0 \leq k \leq n} \binom{n}{k} = 2^n, \quad (22)$$

e seja  $\omega = \omega(n)$  uma função com  $\omega \rightarrow \infty$  conforme  $n \rightarrow \infty$ . Podemos dizer que a soma em (22) está ‘concentrada’ nos termos com  $k$

satisfazendo

$$\left|k - \frac{n}{2}\right| \leq \omega\sqrt{n}, \quad (23)$$

pois

$$\sum_k^* \binom{n}{k} \sim 2^n, \quad (24)$$

onde  $\sum_k^*$  indica soma sobre todos os  $k$  satisfazendo (23) e escrevemos  $f(n) \sim g(n)$  se  $\lim_n f(n)/g(n) = 1$ .

Suponha agora que  $\varepsilon > 0$  é um número real fixo. Podemos dizer que a soma em (22) está ‘exponencialmente concentrada’ nos termos com  $k$  satisfazendo

$$\left|k - \frac{n}{2}\right| \leq \varepsilon n, \quad (25)$$

pois

$$\sum_k' \binom{n}{k} \leq 2^n \exp\{-c_\varepsilon n\}, \quad (26)$$

onde  $\sum_k'$  indica soma sobre todos os  $k$  para os quais (25) *não vale*,  $c_\varepsilon > 0$  é uma constante que depende apenas de  $\varepsilon$ , e supomos  $n \geq n_0(\varepsilon)$ .

(i) Prove (24).

(ii) Prove que a condição de que  $\omega \rightarrow \infty$  é necessária para que (24) valha. Para tanto, use a fórmula de Stirling (12). De fato, use (12) para provar que se  $k = k(n) = n/2 + c_n\sqrt{n}$ , onde  $c_n \rightarrow c$  ( $n \rightarrow \infty$ ) e  $c$  é uma constante, então

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \sim \frac{d}{\sqrt{n}} 2^n, \quad (27)$$

onde  $d = d(c) > 0$  é uma constante que depende apenas de  $c$ .

(iii) Prove (26). Qual é o maior valor de  $c_\varepsilon$  com o qual você consegue provar (26)?

[*Sugestão.* Considere um variável aleatória binomial  $X$  de parâmetros  $n$  e  $1/2$ , de forma que  $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} 2^{-n}$ . Para (i), aplique a desigualdade de Chebyshev. Para (iii), use uma desigualdade para grandes desvios.] {Data de entrega: 24/10/2002}

26. Prove as seguintes estimativas. Nesta questão, escrevemos  $O(f(x))$  para qualquer termo  $y$  tal que  $|y| \leq C|f(x)|$  para todo  $x$  satisfazendo  $|x| \leq x_0$ , onde  $C$  e  $x_0 > 0$  são constantes absolutas. (Observe que, nestas estimativas, estamos interessados em uma vizinhança de 0.)

(i)  $1 + x \leq e^x$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ .

(ii)  $1 + x > \exp\{x - x^2/2\}$  para todo  $0 < x \leq 1$ .

(iii)  $1 - x > \exp\{-x - x^2\}$  para todo  $0 < x < x_0$ , para algum  $x_0 > 0$ .

De fato, podemos tomar, por exemplo,  $x_0 = 0.68$ .

(iv) Prove que  $1 + x \geq \exp\{x/(1+x)\}$  para todo  $x > -1$ . (Este item substituiu dois itens que constavam nesta lista anteriormente.)

[Sugestão. Lembre que  $1/(1-x) = 1 + x + x^2 + \dots$  uniformemente se  $|x| \leq x_0$  e  $x_0 < 1$ . Integre ambos os lados para obter

$$-\log(1-x) = x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \dots]$$

27. Prove as seguintes estimativas para  $\binom{a}{b}$ , onde  $a$  e  $b$  são inteiros não-negativos.

(i) Se  $a \geq b$ , então

$$\binom{a}{b} \geq \left(\frac{a}{b}\right)^b. \quad (28)$$

(ii)

$$\binom{a}{b} \leq \frac{a^b}{b!}. \quad (29)$$

(iii) Para todo  $b > 0$ ,

$$\binom{a}{b} \leq \left(\frac{ea}{b}\right)^b. \quad (30)$$

[Sugestão para (iii). Avalie  $(1+x)^a$  por cima e por baixo para  $x = b/a$ . Use, para tanto,  $1+x \leq e^x$  e o binômio de Newton:  $(1+x)^a \geq \binom{a}{b}x^b$ .]

28. [Shamir–Spencer] Considere o grafo aleatório  $G = G(n, 1/2)$ , ou, equivalentemente, seja  $G$  um grafo escolhido uniformemente ao acaso dentre todos os grafos com  $n$  vértices fixos, digamos  $[n]$ . Defina

$$A_i = \{\{i, j\} : i < j \leq n\} \quad (31)$$

e

$$\Gamma_i = 2^{A_i} = \mathcal{P}(A_i) \quad (32)$$

para todo  $1 \leq i < n$ . Note que os  $A_i$  ( $1 \leq i < n$ ) particionam  $\binom{[n]}{2}$ . Assim, podemos identificar  $G$  com um vetor  $(X_1, \dots, X_{n-1})$ , onde  $X_i \in \Gamma_i$  para todo  $i$ . Note que os  $X_i$  ( $1 \leq i < n$ ) são independentes. Como de usual, seja  $\chi(G)$  o número cromático de  $G$ .

(i) Prove que  $\chi: \prod_{1 \leq i < n} \Gamma_i \rightarrow \mathbb{R}$  é 1-Lipschitz; note que isso equivale a dizer que para quaisquer dois grafos  $G$  e  $G'$  com conjunto de vértices  $[n]$ , se  $E(G) \Delta E(G') = (E(G) \cup E(G')) \setminus (E(G) \cap E(G')) \subset A_i$  para algum  $i$ , então  $|\chi(G) - \chi(G')| \leq 1$ .

(ii) Seja  $\lambda = \lambda(n)$  uma função arbitrária com  $\lambda \rightarrow \infty$ . Mostre que  $\chi(G)$  está concentrada em uma faixa de largura  $2\lambda\sqrt{n}$  em torno de  $\mathbb{E}(\chi)$ , isto é, mostre que a probabilidade de termos

$$|\chi(G) - \mathbb{E}(\chi)| \leq \lambda\sqrt{n}$$

é  $1 - o(1)$ .

(iii) Como de usual, seja  $\omega(G)$  o número de clique de  $G$ , isto é,  $\omega(G)$  é a cardinalidade máxima de um conjunto de vértices mutuamente

adjacentes em  $G$ . Mostre que  $\omega(G) < 2 \log_2 n$  com probabilidade  $1 - o(1)$ , e conclua que  $\chi(G) > n/2 \log_2 n$  com probabilidade  $1 - o(1)$ . [*Sugestão.* Estime o valor esperado do número de  $U \subset [n]$ ,  $|U| = \lceil 2 \log_2 n \rceil$ , com  $\binom{U}{2} \subset E(G)$  (isto é,  $U$  induz um clique). Para tanto, use Ex. 27(iii).]

(iv) Observe que segue de (ii) e (iii) que  $\chi(G) \sim \mathbb{E}(\chi)$  com probabilidade  $1 - o(1)$ .

{Data de entrega: 31/10/2002}

29. Chamemos uma cópia de  $K^3$  (um triângulo) em um grafo  $G$  de *isolado* se ele não tem aresta comum com nenhum outro triângulo. Seja  $Y$  o número conjuntos  $U \in \binom{[n]}{3}$  que induzem um triângulo isolado no grafo aleatório  $G(n, p)$ . Mostre que  $\mathbb{E}(Y) \geq (1/6 - o(1))n^3 p^3$  se  $p = \lambda n^{-2/3}$  com  $\lambda = \lambda(n) \rightarrow \infty$ , mas, digamos,  $\lambda \ll n^{1/6}$ . [*Sugestão.* Seja  $X$  o número de  $U \in \binom{[n]}{3}$  que induzem um triângulo em  $G(n, p)$  e seja  $Z$  o número de  $W \in \binom{[n]}{4}$  que induzem pelo menos 5 arestas. Note que  $Y \geq X - 4Z$ .]<sup>1</sup>
30. Considere o grafo aleatório  $G(n, p)$  com  $p = \lambda n^{-2/3}$ , com  $\lambda = \lambda(n) \rightarrow \infty$  e  $\lambda \ll n^{1/6}$ , e sejam  $X$  e  $Y$  como no Ex. 29. Prove que

$$\mathbb{P}(X = 0) \leq \mathbb{P}(Y = 0) \leq \exp\{-c\lambda^6\} \quad (33)$$

para uma constante  $c > 0$ . [*Sugestão.* Observe que  $Y$  é 1-Lipschitz.]

**Observação.** Infelizmente, a sugestão não está correta (você vê o motivo?). Chamemos uma família de triângulos de *independente* se quaisquer dois triângulos nesta família não têm aresta comum. Seja  $Y'$  a cardinalidade máxima de uma família independente de triângulos. *Mostre que  $Y'$  é 1-Lipschitz.* Use esse fato para provar que

$$\mathbb{P}(X = 0) \leq \exp\{-c\lambda^6\} \quad (34)$$

para alguma constante  $c > 0$ . {Data de entrega: 5/11/2002}

31. [Łuczak] (Continuação do Ex. 30) A cota superior para  $\mathbb{P}(X = 0)$  do Ex. 30 pode ser melhorada para

$$\mathbb{P}(X = 0) \leq \exp\{-cn^3 p^3\} \quad (35)$$

para alguma constante  $c > 0$ , desde que, digamos,  $p \ll 1/\sqrt{n}$ . Eis um roteiro da prova<sup>2</sup>: inicialmente, fixe uma coloração  $\gamma: \binom{[n]}{2} \rightarrow [f]$  de  $\binom{[n]}{2}$  com  $f$  cores, onde  $f \sim Cn^3 p^3$  e  $C$  é uma constante convenientemente grande, e  $|\gamma^{-1}(i)| \leq n^2/f$  para todo  $i$  (isto é, cada cor é usada no máximo  $n^2/f$  vezes).

Defina uma cópia  $H$  de  $K^3$  em  $G(n, p)$  como  $\gamma$ -*isolada* se as cores que ocorrem nas três arestas de  $H$  não ocorrem em nenhuma outra cópia  $H'$  de  $K^3$  em  $G(n, p)$  com  $E(H') \cap E(H) = \emptyset$ . Seja  $Y_\gamma$  o número de cópias isoladas de  $K^3$  em  $G(n, p)$ .

<sup>1</sup>Os enunciados dos Ex. 29–32 ainda podem sofrer certa revisão.

<sup>2</sup>Eu ficaria contente se alguém pudesse verificar este roteiro.

(i) Prove que

$$\mathbb{E}(Y_\gamma) \geq c_1 n^3 p^3 \quad (36)$$

para alguma constante  $c_1 > 0$  desde que  $C$  seja suficientemente grande. [*Sugestão.* Sejam  $X$  e  $Z$  como no Ex. 29. Como  $\mathbb{E}(Z) \ll \mathbb{E}(X)$ , podemos ignorar cópias de  $K^3$  que não são isoladas (no sentido do Ex. 29). Seja agora  $Z_\gamma$  o número de pares  $(H, H')$  de cópias de  $K^3$  em  $G(n, p)$ , com  $E(H) \cap E(H') = \emptyset$  e com alguma aresta em  $H$  e alguma aresta em  $H'$  da mesma cor (isto é, ambos  $H$  e  $H'$  encontram um mesmo  $\gamma^{-1}(i)$  para algum  $i$ ). Você pode estimar  $\mathbb{E}(Z_\gamma)$  por

$$O\left(f \binom{n^2/f}{2} n^2 p^4\right) = O(n^3 p^3 / C).$$

Conclua (36).]

(ii) Ponha agora  $\Gamma_i = 2^{\gamma^{-1}(i)} = \mathcal{P}(\gamma^{-1}(i))$  ( $1 \leq i \leq f$ ). Observe que  $G(n, p)$  pode ser identificado com um vetor  $(X_1, \dots, X_f)$  com os  $X_i \in \Gamma_i$  para todo  $i$  e com os  $X_i$  independentes. Prove que  $Y_\gamma$  é 1-Lipschitz, no sentido que se temos dois grafos  $G$  e  $G'$  com  $E(G) \Delta E(G') = (E(G) \cup E(G')) \setminus (E(G) \cap E(G')) \subset \gamma^{-1}(i)$  para algum  $i$ , então  $|Y_\gamma(G) - Y_\gamma(G')| \leq 1$ .

(iii) Conclua (35).

32. Dado um grafo  $G$ , seja  $\chi_3(G)$  o número mínimo de partes em que podemos particionar o conjunto de vértices de  $G$  de forma que cada uma das partes não induza triângulos. Equivalentemente,  $\chi_3(G) = k$  se podemos colorir os vértices de  $G$  com  $k$  cores de forma que nenhum triângulo fique monocromático (tenha seus 3 vértices da mesma cor), mas  $k - 1$  cores não bastam.<sup>3</sup> Prove que, para todo inteiro  $k$ , existe um grafo  $G$  que não contém  $K^4$ , mas temos  $\chi_3(G) \geq k$ . [*Sugestão.* Considere  $G(n, p)$  com  $p = \lambda n^{-2/3}$  com  $\lambda = \lambda(n)$  apropriado. Use (35) para mostrar que, com probabilidade  $1 - o(1)$ , conjuntos que não induzem  $K^3$  em  $G(n, p)$  são de cardinalidade  $o(n)$ . Altere  $G(n, p)$  de forma apropriada para obter  $G$  como no enunciado.] {Data de entrega: 5/11/2002}

33. Seja  $G = G^n$  um grafo com  $n$  vértices e grau máximo

$$\Delta = \Delta(G) = \max\{\deg(x) : x \in V(G)\}.$$

Seja  $m = |E(G)|$  o número de arestas em  $G$ . Seja  $0 < p = p(n) < 1$  e suponha que escolhemos um conjunto aleatório  $W \subset V(G)$  pondo  $\mathbb{P}(x \in W) = p$ , independentemente para todo  $x \in V(G)$ . Seja  $Y$  o número de arestas induzidas por  $W$ , isto é,

$$Y = \left| E(G) \cap \binom{W}{2} \right|.$$

Ponha  $\mu = \mathbb{E}(Y)$ .

---

<sup>3</sup>Definindo  $\chi_2(G)$  de forma análoga,  $\chi_2(G) = \chi(G)$ , o número cromático usual de  $G$ .

(i) Observe que  $\mu = p^2 m$ . Observe também que  $Y$  é  $\Delta$ -Lipschitz, isto é, se  $W \Delta W' = (W \setminus W') \cup (W' \setminus W)$  é unitário, então  $|Y(W) - Y(W')| \leq \Delta$ .

(ii) Deduza que, para todo  $t \geq 0$ , temos

$$\mathbb{P}(|Y - \mu| \geq t) \leq 2 \exp\{-t^2/2\Delta^2 n\}. \quad (37)$$

(iii) Prove que, para alguma constante universal  $c > 0$ ,

$$\mathbb{P}(|Y - \mu| \geq t) \leq 4 \exp\{-ct^2/\Delta^2(\mu + t)\} \quad (38)$$

para todo  $t \geq 0$ . [*Sugestão.* Note que, para todo inteiro  $r \geq 1$ , a desigualdade  $Y \geq r$  pode ser justificada por um certificado de “tamanho” no máximo  $2r\Delta^2$ ; isto é, tome  $\psi(r) = 2r\Delta^2$ .]

(iv) Suponha agora que  $G$  é  $d$ -regular, isto é, todos os seus vértices têm grau  $d$ . Deduza de (37) e (38) que se

$$p \gg \min\{n^{-1/4}, \sqrt{d/n}\},$$

então  $Y \sim \mu$  com probabilidade  $1 - o(1)$ ; isto é, para alguma função  $g(n) \rightarrow 0$ , temos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|Y/\mu - 1| \leq g(n)) = 1.$$

{Data de entrega: 19/11/2002}

34. [Janson] Este exercício ilustra uma forma alternativa de se provar o resultado no Ex. 31.

(i) Prove (35) usando a desigualdade de Janson. Mais explicitamente, mostre que existe uma constante absoluta  $c > 0$  tal que se  $p \ll 1/\sqrt{n}$ , então (35) vale.

(ii) Suponha agora que  $p \gg 1/\sqrt{n}$ . Mostre que a desigualdade (35) não vale. Mostre, entretanto, que

$$\mathbb{P}(X = 0) \leq \exp\{-cpn^2\}$$

para alguma constante  $c > 0$ . Prove ainda que

$$\mathbb{P}(X = 0) \geq \exp\{-c'pn^2\}$$

para alguma constante  $c' > 0$ .

{Data de entrega: 19/11/2002}

35. [Kleitman] Suponha que  $\mathcal{F}$ ,  $\mathcal{G}$ ,  $\mathcal{H}$ , e  $\mathcal{I}$  são sistemas de conjuntos sobre o conjunto  $X = [n]$ , isto é,  $\mathcal{F}$ ,  $\mathcal{G}$ ,  $\mathcal{H}$ , e  $\mathcal{I} \subset 2^X = \mathcal{P}(X)$ . Suponha ainda que  $\mathcal{F}$  e  $\mathcal{G}$  são “fechados por se tomar subconjuntos” e  $\mathcal{H}$  e  $\mathcal{I}$  são “fechado por se tomar superconjuntos”. Isto é, se  $F \subset F' \in \mathcal{F}$ , então  $F' \in \mathcal{F}$  e analogamente para  $\mathcal{G}$ ; enquanto que se  $H \subset H'$  e  $H \in \mathcal{H}$ , então  $H' \in \mathcal{H}$  e analogamente para  $\mathcal{I}$ . Prove que

$$|\mathcal{F} \cap \mathcal{G}| \geq 2^{-n} |\mathcal{F}| |\mathcal{G}|, \quad (39)$$

$$|\mathcal{H} \cap \mathcal{I}| \geq 2^{-n} |\mathcal{H}| |\mathcal{I}|, \quad (40)$$

e

$$|\mathcal{F} \cap \mathcal{H}| \leq 2^{-n} |\mathcal{F}| |\mathcal{H}|. \quad (41)$$

[*Sugestão.* É suficiente provar, por exemplo, (41). Para tanto, fixe um  $x \in X$  e considere os membros de  $\mathcal{F}$  e  $\mathcal{H}$  que contêm  $x$  e os membros de  $\mathcal{F}$  e  $\mathcal{H}$  que não contêm  $x$  separadamente, e use indução em  $n = |X|$ .]

36. [Janson, Łuczak, e Ruciński] Sejam  $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}([n]) = 2^{[n]}$ ,

$$X_S = [S \subset \Gamma_{p_1, \dots, p_n}],$$

e  $X = \sum_{S \in \mathcal{S}} X_S$ , como em sala. Seja ainda  $\Delta = \sum_{A, B} \mathbb{E}(X_A X_B)$ , onde a soma é sobre os pares ordenados  $(A, B) \in \mathcal{S} \times \mathcal{S}$  com  $A \neq B$  e  $A \cap B \neq \emptyset$ .

- (i) Ponha  $\Psi(s) = \mathbb{E}(e^{-sX})$ , para todo  $s \geq 0$ . Prove que

$$\log \mathbb{P}(X = 0) = \int_0^\infty (\log \Psi(s))' ds. \quad (42)$$

- (ii) Seja  $Y_A = \sum_{B} X_B$ , onde a soma é sobre todos os  $B \in \mathcal{S}$  com  $A \cap B \neq \emptyset$ . Prove que

$$\int_0^\infty \mathbb{E}(e^{-sY_A} | X_A = 1) ds = \mathbb{E}(1/Y_A | X_A = 1). \quad (43)$$

- (iii) Seja  $Y'_A = Y_A - X_A$ . Use que  $1/(1+y') \geq 1 - y'/2$  para  $y' \geq 1$  para deduzir que

$$\sum_{A \in \mathcal{S}} \mathbb{P}(X_A = 1) \mathbb{E}(1/Y_A | X_A = 1) \geq \mu - \Delta, \quad (44)$$

onde  $\mu = \mathbb{E}(X)$ .

- (iv) Finalmente, lembre que provamos que

$$-(\log \Psi(s))' \geq \sum_{A \in \mathcal{S}} \mathbb{P}(X_A = 1) \mathbb{E}(e^{-sY_A} | X_A = 1). \quad (45)$$

Deduza de (42)–(45) que

$$\mathbb{P}(X = 0) \leq e^{-\mu + \Delta}. \quad (46)$$

{*Data de entrega:* 21/11/2002}

37. Vimos dois teoremas de Roth. A grosso modo, estes resultados podem ser enunciados da seguinte forma: (i) Para qualquer  $A \subset [N]$ , existe uma progressão aritmética  $P \subset [N]$  para o qual a discrepância

$$||A \cap P| - \eta|P||,$$

onde  $\eta = |A|/N$ , é ‘grande’. (ii) Para qualquer conjunto  $A \subset [N]$  com  $|A|/N \geq \eta$ , onde  $\eta > 0$  é uma constante positiva, se  $N \geq N_0(\eta)$ , então  $A$  contém uma progressão aritmética com três elementos. Escreva a prova destes dois resultados em um único texto, de forma organizada, destacando os princípios comuns e as tecnicidades específicas de cada uma das demonstrações. {*Data de entrega:* 10/12/2002}